Digitized by Google

Digitized by Google

Ccc
969

Digitized by Google

Ueber

den Kartoffelbau

in

Großbritannien.

Aus dem Englischen übersetzt und für teutsche Landwirthe umgearbeitet

von

M. G. F. Leonhardi,

ordentlichem Professor der Oekonomie an der Universität Leipzig, der Leipziger Oeconomischen Societät, der Hallischen Naturforschenden Gesellschaft, der königlich-Preußisch-Märkischen Oekonomischen Gesellschaft und der herzoglich-Sächsisch-Gothaischen Societät der Forst- und Jagdkunde zu Waltershausen Ehrenmitgliede und Correspondenten.

Leipzig,
bey Friedrich Gotthelf Baumgärtner.

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

Digitized by Google

Vorrede.

Unter der großen Verschiedenheit der Küchengewächse, woran dieses Königreich einen Ueberfluß hat, ist doch keins so gemeinnützig, als die Kartoffeln. Man muß sie also höher, als andere Tischgewächse schätzen, weil man sich ihrer verschiedne Monate des Jahrs hindurch bedienen und sie bey jeder Witterung aufbewahren kann, wenn Kälte oder Schnee andre Erdfrüchte dieser Art für uns verschliessen, oder die Jahrszeit sie ungenießbar macht.

Man kann also gewiß behaupten, daß es keine so nutzbare Wurzel oder Erdfrucht mehr giebt, als die Kartoffeln, und ich glaube auch, daß keine Erdfrucht so verschieden zubereitet, oder zu so mannigfaltigem Nutzen angewendet werden könne.

Sie sind nicht allein dem menschlichen Geschlechte nützlich, sondern werden auch begierig und als ein vorzügliches Nahrungsmittel von allen vierfüßigen Thieren und Federvieh genossen.

Nichts destoweniger hat man die vortreflichen Eigenschaften dieses Gewächses und dessen Nutzen weder gänzlich eingesehen, noch dessen Bebauung in den südlichen Grafschaften Englands sehr betrieben, wie die Einwohner selbst versichern, und auch ich die Beobachtung gemacht habe. Berühmter sind die nördlichen Theile dieses Königreichs wegen dieses

ſes Gewächſes und vorzüglich die Grafſchaft Lancaſter. Daſelbſt ſind Kartoffeln die vorzüglichſte Nahrung der geringern Stände und beinahe die einzige Speiſe der Kinder. Sie werden auch von Perſonen höherer Klaſſen ſehr geſchätzt, ſo daß man nicht leicht ein Gaſtmal findet, wo ſie nicht auf die Tafel geſetzt würden.

Man ſchätzt ſie als ein ſehr gutes Gericht, zu allen Arten von Fleiſch, Geflügel und Fiſch, man mag es zubereiten wie man will, und doch zieht man ſie bey aller Manigfaltigkeit der Zubereitung jedem Gartengewächſe vor.

Aus verſchiedenen Nachrichten vernahm ich, daß die Anbauung dieſes Gewächſes ſehr ernſtlich von der Landwirthſchaftsgeſellſchaft ſey anbefohlen, und große Aufmunterung zur Vermehrung ihrer Pflege gegeben worden. Ich zog dahero von einigen Bewohnern in Lancaſhire Nachrichten ein, die ich nebſt den Meinigen dem Publikum unter dem Titel: An account of the Manner in which Potatoes are cultivated and preſerved etc. mittheile. Auſſer dieſer Schrift des Hrn. Kirkpatrick habe ich noch die eines Irelanders, welche den Titel führt: An Account of the Culture of Potatoes in Ireland, zugleich mit überſetzt und benutzt. Ich hoffe durch dieſe Bearbeitung meinen Landsleuten keinen unangenehmen Dienſt geleiſtet zu haben und wünſche nichts mehr, als daß man auch bey uns ſo viele Sorgfalt auf den Kartoffelbau wie in England wenden möge.

Leipzig in der Oſtermeſſe 1797.

Der Ueberſetzer.

Digitized by Google

Ueber
den Kartoffelbau
in
Großbritannien.

Digitized by Google

Einleitung.

Die Kenntniß der Methoden frühzeitige und reichliche Kartoffelärndten zu gewinnen muß gerade itzt (nämlich in den Jahren 1795 und 1796) in vielen Theilen von England, Schottland und Ireland besonders wünschenswerth seyn, weil die Theurung der Lebensmittel zu einem so ungewöhnlichen Preiße angestiegen ist. Dieser Umstand bewog daher auch im Frühjahre 1795 die Ackerbaugesellschaft zu London ernstlich auf Mittel zu denken, diesem Uebel, das durch einen verderblichen Land- und Seekrieg noch vergrößert wurde, auf irgend eine Weise, wo nicht ganz, doch zum größten Theile abzuhelfen.

Nach langen Hin- und Herdenken fand diese achtungswerthe Gesellschaft das sicherste Mittel, den Mangel an Lebensmitteln zu ersetzen, im Kartoffelbaue, weil diese Frucht gerade für die ärmste aber auch in Großbritannien zahlreichste Menschenclasse die wohlfeilste und nahrhafteste sey. In dieser Rücksicht sendete sie in alle Grafschaften des Königreichs verschie-

Digitized by Google

dene Fragen an die Landwirthe über den Kartoffelbau und erhielt darauf die befriedigendsten Antworten über den Kartoffelbau im Großen, welche sie öffentlich durch den Druck bekannt machte *), und dadurch zugleich bewieß, daß jeder Landwirth aus dem Kartoffelbaue nicht nur sehr großen Gewinn ziehen könne, sondern auch daß die ärmsten Volksclassen dadurch in jeder Jahreszeit ein hinreichendes Ergänzungsmittel ihrer Nahrungsbedürfnisse haben würden.

Erster Abschnitt.

Geschichte des Kartoffelbaues.

Lange Zeit hat man Virginien für das Vaterland der Kartoffeln — Solanum tuberosum — nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Teutschland gehalten, da sie doch daselbst eben so wohl Fremdlinge sind, als wie in England und in dem übrigen Europa. Das wahre Vaterland derselben ist Peru **), woselbst sie wild wachsen und von jeher die einzige

*) S. *Report* of the *Committee* of the *Board* of *Agriculture* concerning the *Culture* and *Use* of *Potatoes*. London 1795 in 4to. Aehnliche Fragen machte auch die Badendurlachsche Rentkammer 1780 bereits an die dasigen Landwirthe. Der Ueb.

**) Peru liegt in Südamerika in der Nachbarschaft von Terra Firma, vom Amazonenlande, von Paraguay und Chili, und hat gegen Abend das stille Meer. Es wird von

zige Brodtfrucht für die Bewohner der kalten Gebürge gewesen sind. Sowohl die Landeseinwohner, als wie auch die Portugiesen und Spanier bereiten daselbst ausser dem Brodte noch mancherley Gerichte daraus.

Mit historischer Gewißheit weiß man, daß der Sklavenhändler, Johann Hawkins, die ersten Kartoffeln 1565 aus Neugranada in Südamerika nach Ireland, und der Engländer Sir Franz Drake *), nach seiner Zurückkunft von der Expedition nach dem spanischen Westindien, dieselben auf seiner Rückfahrt 1585 zuerst nach Virginien und 1586 nach England gebracht hat. Da nun Drake bey seiner gedachten Zurückkunft mehrere Colonisten aus Virginien wieder mit den Kartoffeln zugleich nach England brachte, so verbreitete sich dadurch der Irrthum, als wäre Virginien das Vaterland derselben, indessen sie dort doch mit größerer Mühe und geringern Ertrage, als wie in England und dem übrigen Europa gezogen werden. Die ersten Saamenkartoffeln gab Drake dem berühmten englischen Botanisten Gerard

von den Andischen Gebürgen durchschnitten, ist sehr heiß, hat viel Gold, Silber und andere Mineralien, edle Pflanzen, Getrayde und Vieh in Menge. Sonst gehörte dieses Königreich ganz den Spaniern, aber 1777 ward in Südosten ein ansehnliches Stück davon an Portugal abgetreten. D. Ueb.

*) Franz Drake, einer der berühmtesten engländischen Seehelden, ward 1550 gebohren und starb 1596. D. Ueb.

Digitized by Google

rard *), der sie in seinem Garten zu London erzog und vervielfältigte, und seinem Freunde, dem niederländischen Botanisten Clusius **), Saamenkartoffeln davon übersendete, welcher sie in Burgund und Holland ausbreitete. Obschon die Kartoffeln erst durch Caspar Bauhin ***) 1590 beschrieben worden sind, so sollen sie doch bereits vom Hieronymus Cardanus, einem berühmten Naturforscher des sechszehnten Jahrhunderts, 1580 in Italien bekannt gemacht und 1588 dort sogar angebauet worden seyn.

Um das Jahr 1610 oder 1623 brachte der unglückliche Walther Raleigh die Kartoffeln zum zweyten mahle aus Virginien nach Ireland, woselbst sie zuerst in dem Garten um Youghall gebauet worden seyn sollen, ob dieselben schon, wie oben gedacht wurde, in Ireland und in England weit früher bekannt gewesen sind. In Schottland hingegen hat sie Graham 1746 auf Kilsyth zuerst angebauet.

In

*) Dieser berühmte Botaniste, John Gerard, hat unter andern nachstehende, beide hierher gehörige Schriften herausgegeben: *John Gerard* Catalogus arborum ac plantarum in horto Gerardi nascentium. Lond. 1596 in 4to. und Herball with brass cutts in colours. London 1597. fol. D. Ueb.

**) Von den vielen Schriften dieses Botanisten gehören hieher: *Caroli Clusii* rariorum plantarum Historiae. Antwerp. 1601. fol. und Exoticarum Lib. X. Antwerp. 1605. fol. D. Ueb.

***) in seinem Prodromus. Francof. 1620. 4to. S. 89. Der Ueb.

Digitized by Google

In Frankreich, und zwar namentlich zu Paris, hat man 1616 die Kartoffeln noch an der königlichen Tafel als eine Seltenheit gespeiset.

Nach Schweden sind die Kartoffeln 1726 durch Jonas Alström und in Finland erst 1737 bekannt worden.

In den Schwäbischen Kreis, und zwar in das Herzogthum Würtenberg, hat sie ein Colonist der Waldenser, Antoine Seignoret, 1710 eingeführt; und nach Sachsen brachte sie der Generallieutenant von Milkau 1717, als die einzige, aber weit glücklichere Beute aus dem verderblichen Brabantischen Kriege mit, die in der Folge weit mehr Nutzen gestiftet hat, als alle erfochtene Siege, eroberte Geschütze, Provinzen und Gelderpressungen, die gewöhnlichen Schadloshaltungen des Siegers für aufgeopferte Menschenhaufen. Allein im Voigtlande führte man den Kartoffelbau erst 1750 ein; in Westphalen und Niedersachsen aber gegen das Jahr 1740. Denn die von Johann Royer *) zu Hessen im Braunschweigschen erwähnten Tartuffeln **) sind ein von den Kartoffeln ganz verschiedenes Gewächs.

*) Beschreibung des fürstl. Gartens zu Hessen Halberstadt 1648. Braunschweig 1653 in 4to. und Edit. 2da. 1658. D. Ueb.

**) Nämlich die sogenannten Erdäpfel, Erdartischocken — Helianthus tuberosus — Engl. Jerusalem Artichoke — Franz. Topinambours. D. Ueb.

Weit ſpäter ſind endlich die ſogenannten Howard's Kartoffeln oder Viehkartoffeln, auch Neuengländiſche, Amerikaniſche, wilde, Ochſen- oder Saukartoffeln — Varn Battates in Amerika genannt, in England bekannt und nach Teutſchland herüber gebracht worden. Dieſe Howard's-Kartoffeln, wovon oft ein Stück 3 bis 4 Pfund wiegt, brachte ein Matroſe mit nach England, woſelbſt ſie 1711 zuerſt in Bedfordſhire ein gewiſſer Howard angebauet hat.

Zweiter Abſchnitt.

Von den verſchiedenen Kartoffelarten.

Die Kartoffeln — Solanum tuberoſum — auch Erdbirne, Grundbirne, Erdtuffel, Grüblingsbaum, Toffeln, Erdtoffeln, Töffelgen, Knollen, Nudeln, Patatten genannt; Engl. Potatoes; in Amerika überhaupt Papas, in Virginien beſonders Openank; in Italien Tartoffoli; in Holland Aardappelen; franz. Pommes de terre, des Patates oder la Truffle; — gehören nach dem Linneſchen Pflanzenſyſtem in die fünfte Klaſſe, welche die Gewächſe mit 5 Staubfäden enthält, und zwar zum Geſchlecht des Nachtſchatten — Solanum — in die erſte Ordnung unter die Pflanzen mit einem Staubwege. Der Stengel iſt unbewehrt und krautartig; die Blätter ſind gefiedert und glattrandig und die Blumenſtiele vielfach zertheilt. Die aus vielen vermittelſt

mittelst dünner Fasern verbundenen Knollen bestehende Wurzel dauert mehrere Jahre aus und dient hauptsächlich zur Vervielfältigung dieser nützlichen Pflanze.

Gegenwärtig kennt man von dieser unschätzbaren Pflanze in England und Teutschland nachstehende Spielarten oder Abänderungen, welche

A. in frühzeitige oder Sommerkartoffeln und

B. in spätreifende oder Winterkartoffeln eingetheilet werden.

A. Die frühzeitigen oder Sommerkartoffeln sind:

1) glatte gelbweiße Kartoffeln — Smooth Yellows — die auch unter dem Namen weiße Kartoffeln und Buttergrundbirnen in Teutschland bekannt sind, und theils platte nicht merklich runde, theils ganz runde Früchte tragen. In Ansehung der Menge von Früchten, welche auch sehr mehligt und schmackhaft sind, zeichnet sich diese Art vor den übrigen weissen Kartoffelarten aus; allein sie hat den Fehler, daß in etwas feuchten Jahren im Fleische derselben häufig schwarze faserichte und verhärtete Flecken entstehen. Das Kraut ist gelbgrün, die Blüthe weiß, der Geschmack etwas süßlich und die Kartoffel selbst hat mit der in Teutschland bekannten Pfälzererdbirne sehr viel Aehnlichkeit.

2) Weiße Champions — White Champions —

3) Goldgelbe Birchalkartoffeln — Birchal Golden Yellows —

4) Goldfarbige kleine Kartoffeln — Golden Tags —

5) Goldgelbe Schiffskartoffeln — Golden Galleons — Sie sind lang, glattschaalig, groß, an dem einen Ende mehr spitzig, am andern aber stumpf, fast durchgehends plattgedrückt, so daß sie viel Aehnlichkeit mit einem Weberschiffe haben, daher auch der Name Schiffskartoffeln zu kommen scheint. In den Rheingegenden sind sie ebenfalls bekannt, s. Kupfert. 3. Sie haben eine stark gelbbraune, ins goldgelbe spielende Schaale, wenig flachliegende Keimaugen, deswegen auch wenig Blüthen und Saamenäpfel, und kochen sich in der Schaale sehr wäßrig, besser aber ohne dieselbe.

6) Rothe Champions — Red Champions — sind in Teutschland unter dem Namen lange rothe runde Erdbirnen oder Mauser bekannt, und haben eine theils runde, theils ovale, theils längliche Gestalt, und einige derselben blühen weiß, andere pfirsichblüthroth. Unter der Schaale sind sie zum Theil ganz weiß, zum Theil röthlich.

7) Marmorirte oder buntfarbige Kirkhamkartoffeln — Kirkham Marbles — kennt man unter dem Namen blaßfleischfarbene oder halbrothe oder hellbraune Kartoffeln, oder sogenannte Pfälzergrundbirne, mit einer blaßrothen Schaale und höckerigten Oberfläche, das inwendige Fleisch aber ist weiß-

weißgelblich und die Blüthe ganz weiß. Sie tragen reichlich und werden gleich nach Johannis reif. Die gelblichgrünen Blätter ſitzen an braungrünen einfachen Stängeln.

8) Die Königinkartoffel — Lady Queens — ſind vielleicht unſere Sommer- oder Zuckerkartoffeln.

9) Wäßrige oder berauſchende Landkartoffeln — Drunken Landlord —

10) Engliſche Champions — Engliſh Champions —

11) Allerbeſte Kartoffeln — Invincible —

12) Hatley's unvergleichliche Kartoffeln — Hatley's Nonſuch —

13) Boſkow's nierenförmige Kartoffeln — Boſkow's Kidneys —

14) Frühe Perrins Kartoffeln — Early Perrins —

15) Frühzeitige Manleys Kartoffeln — Early Manleys —

16) Sehr frühzeitige Zwergkartoffeln — Dwarfs for forcing —

17) Briton's Zwergkartoffeln — Briton's Dwarfs —

18) Ba-

Digitized by Google

18) Bate's Zwergkartoffeln — Bate's Dwarfs —

19) Broughton's Zwergkartoffeln — Broughton's Dwarfs —

20) Smith's aus dem Saamen gezogene Kartoffeln — Smith's Seedlings —

21) Tox's aus dem Saamen gezogene Kartoffeln — Tox's Seedlings —

22) Mather's dergleichen — Mather's ditto —

23) Doubobins dergleichen — Doubobin's ditto —

B. Die spathreifenden oder Winterkartoffeln sind:

1) Weiße amerikanische Kartoffeln — America White Rangers — sind in Teutschland unter dem Namen große runde weiße Kartoffeln bekannt und im Geschmack die vorzüglichsten. Sie blühen theils ganz weiß, theils auch fleischfarbig, und haben lichtgrüne Saamenkugeln oder Saamenäpfel und wenn sie recht reif sind, eine etwas rauhe weiße Schaale. Sie verlangen guten Mittelboden, tragen sehr reichlich, sind mehligter als alle andern und platzen beym Kochen auf.

2) Lords- oder Herrenkartoffeln — Lords — sind wahrscheinlich die in Teutschland unter dem Namen Sammetkartoffeln bekannten Erdbirnen — Sola-

Solanum tuberoſum var. folio ſericeo — deren Blätter auf der obern Seite rauch wie Sammet ſind. Sie iſt ganz weiß, hat einen guten Geſchmack, wird aber nicht ſo groß wie die erſte Art und erfriert auch leichter.

3) Blaßrothe höckrige nierenförmige Kartoffeln — Pink Noſed Kidneys — ſ. Taf. 4. ſind auch in Teutſchland bekannt und gleichen in allen den unter A. No. 7. aufgeführten, nur ſind ſie größer, werden ſpäter reif und haben einen beſſern Geſchmack.

4) Blaßrothe Augenkartoffeln — Pink Eyes — auch in Teutſchland bekannt und müſſen weitläuftig gepflanzt werden.

5) Späte nierenförmige Kartoffeln — Late Kidneys —

6) Winternierenförmige Kartoffeln — Winter Kidneys — Beyde letztere Arten gleichen in Anſehung der Geſtalt, Farbe und Geſchmack den oben unter A. No. 13. aufgeführten Kartoffeln.

7) Rothe amerikaniſche Kartoffeln — America Red Rangers — kennt man in Teutſchland unter dem Namen runde rothbraune rauchſchaalige Donnersberger Kartoffeln, weil ſie wahrſcheinlich auf dem Donnersberge und in der umliegenden Gegend am erſten erbauet worden ſind und daſelbſt noch am häufigſten erbauet werden. Sie haben einen hohen ſtarken braunen Stengel, der viele Nebenzweige treibt, blühen häufig theils weißlich, theils röthlich, und ſetzen in gutem Mittelboden in fruchtbaren Jahren viele

le Saamenäpfel an. Die Kartoffeln selbst hängen überaus voll an den Wurzeln, werden sehr dick, haben nicht viele aber tiefliegende Keimaugen und ihr Geschmack ist im unausgearteten Zustande sehr gut, verliehren ihn jedoch in Teutschland, wenn man sie fünf bis sechs Jahre hintereinander erbauet und keine frischen Saamenkartoffeln, durch die Saat des in den Saamenäpfeln befindlichen Saamens, erzogen hat. Mit ihnen haben viele Aehnlichkeit

8) die hochstämmigen Kartoffeln — Stem Potatoes — nur sind sie kleiner.

9) Rothe Darbyshire Kartoffeln — Darbyshire Reds — kommen mit den in Teutschland unter dem Namen runde rothe glattschaalige kleine Kartoffeln überein, welche einen schwachen, niedrigen, fast auf der Erde mit vielen Nebenzweigen hinlaufenden Stengel haben. Der größte Theil dieser Pflanze blüht in Teutschland nicht und artet am wenigsten aus. Der Geschmack ist unverbesserlich.

10) Rothe Winterkartoffeln — Winter Red — gleichen den in Teutschland unter dem Namen rauhschaalige braunrothe Kartoffeln, oder auf dem linken Rheinufer Geisberger Kartoffeln, bekannten Erdbirnen, welchen Namen sie vermuthlich von dem im untern Elsaß liegenden Orte Geisberg erhalten haben, und von wo aus sie sich weiter verbreiteten. Auch findet man sie ebenfalls im Westrich, an der Glan und an der Nahe. Der Stengel ist stark, braun, wird hoch und bekommt wenig Nebenzweige,

aber

Digitized by Google

aber viele Blüthen und Saamenäpfel. Die gleichſam plattgedrückte Kartoffeln werden faſt ſo groß wie No. 7., fangen aber erſt nach Bartholomäi an recht zu wachſen, und die Einärndte iſt nach den Viehkartoffeln die ergiebigſte. Ihr Geſchmack iſt bis gegen Faſtnacht hin etwas ſtrenge; aber alsdenn bis zur neuen Aerndte hin, vortreflich, und dauert daher unter allen Kartoffeln am längſten.

11) Späte Champions — Late Champions — gleichen den unter A. No. 2 und 6 aufgeführten frühzeitigen Kartoffeln, nur reifen ſie erſt im October.

12) Veredelte Ochſenkartoffeln — Oxnoble — ſind in allem den Howardskartoffeln gleich, nur haben ſie einen weit beſſern Geſchmack.

13) Irländiſche Kartoffeln — Iriſh Apples —

14) Surinamkartoffeln — Surinam —

15) Killamancaskartoffeln — Killamancas —

16) Budworth's Staubkartoffeln — Budworth's Duſters —

17) Büſchel oder traubenartige Kartoffeln — Cluſter — gleichen in Anſehung des Krauts, der Blüthe und Frucht den Howards- oder Viehkartoffeln.

18) Kupferfarbige platte Kartoffeln — Copperplates —

Digitized by Google

19) Pferdefußkartoffeln — Horse Legs —

20) Armemanns Kartoffeln — Poor Man's Profit —

21) Neger- oder schwarze Kartoffeln — Blackamoors — Solan tuberos. var. radice nigra — haben eine schwarzblaue Schaale, mit ähnlichen Streifen durchzogenes etwas schlüssiges Fleisch, tragen in Teutschland nicht reichlich und werden größtentheils zur Viehfütterung gebraucht.

22) Howards Kartoffeln — Howard's Potatoes —

23) Balmer's aus dem Saamen gezogene Kartoffeln — Balmer's Seedlings — und noch mancherley dergleichen Arten.

Dieß ist das Verzeichniß der im Königreiche am meisten gebräuchlichen Kartoffeln: denn es enthält noch lange nicht alle die Spielarten, welche in den verschiedenen Gegenden gebauet werden. Da viele Personen wünschen möchten, sich mit den verschiedenen so eben genannten Kartoffelarten zu versorgen, so erbittet sich Hr. Kirkpatrik, wohnhaft auf seinem Landguthe an der hohen Straße zwischen Warrington und Wigan, neun engl. Meilen von Warrington *), auf Ver-

*) Warrington ist eine der vorzüglichsten Städte Englands und liegt in der zu Northumberland gehörigen Grafschaft Lancaster. Sie hat 10,000 Einwohner, welche gute Nadeln, grobe Tücher, Schuhe, Leinendamast,

Verlangen dieſelben um die billigſten Preiſe zu verſchaffen und zu gleicher Zeit auch noch beſonders, mit Rückſicht auf die daſigen Ortsumſtände ſeine Erfahrungen darüber mitzutheilen, welches die vorzüglichſten Arten ſind, ob ſie frühzeitig oder ſpät reifen, für Menſchen oder Vieh ſich am beſten ſchicken.

Er hat eine eigene aus dem Saamen gezogene ſehr frühzeitige Kartoffelart, welche er als die einzige und beſte für Miſt- und Treibebeethe allen Guts- und Gartenbeſitzern empfiehlt. Jede Art, die er bisher in Frühbeethen hat erziehen ſehen, iſt zu lang in dem Stengel gewachſen und kann nicht in einem engen Raume erhalten werden. Allein ſeine Sorte wächſt im Freyen nicht über zwey engl. Zoll hoch und im Treibehauſe nicht über einen Fuß. Sie iſt gelb und nierenförmig — kidney — und ſo ſchön als er nie eine geſtaltet geſehen hat, von feinen Mehltheilchen und angenehmen Geſchmack, beſitzt alles empfehlungswürdige und iſt in der That eine große Merkwürdigkeit zur Zeit des Wachsthums. Der Preis für ein Pfund Saamenkartoffeln iſt fünf Schillinge; und kein Landwirth wird dieſen Preis zu hoch finden, der eine gute frühe Kartoffel für ſeine Treibehäuſer oder Miſtbeethe zu beſitzen wünſcht.

Jeder Landwirth kann auch vom H. Kirkpatrik aus dem Saamen gezogene Saatkartoffeln ſowohl von

damaſt, Eiſenwaaren, Zucker, Ale, Segeltuch, Kupfer und Glas verfertigen. D. Ueb.

von der ersten als zweyten Aerndte erhalten, welche mancherley Spielarten liefern, die in Ansehung des Ertrages jede andere Kartoffelart übertreffen.

Dritter Abschnitt.

Von den Saamen- oder Saatkartoffeln.

Alles kommt beym Kartoffelbaue auf die Auswahl der Saatkartoffeln an, weil sie durch öfteres Säen oder Einlegen so leicht ausarten, wogegen nur in der Regel das wiederholte Erziehen neuer Saatkartoffeln aus den Saamenkörnern sichern kann. Die eigentlichen Saamenkörner der Kartoffeln säen in England und Ireland nur einige *) nachdenkende Guthsbesitzer und Gärtner, bisweilen in der Absicht um daraus neue Spielarten zu erziehen, nicht aber um ihre Saatkartoffeln dadurch zu verbessern. Uebrigens aber mag der Kartoffelsaamen von einer Art, von welcher es sey, gezogen werden, so kann man doch nie darauf rechnen, daß aus diesen Saamenkörnern wiederum eben dieselbe Art rein erwächst, sondern es entstehen gewiß daraus verschiedene Spielarten. Dieser Umstand sowohl,

*) Auch in Teutschland ist dieß leider der Fall, und man hat die vom verstorbenen Grafen von Lynar, so wie des H. n. Schröter in St. Petersburg, gemachten glücklichen Versuche mit einer unbegreiflich n Kälte gelesen und vergessen. Weitläuftig hat dieselben der H. Commissionsrath Riem in seiner Physik. ökon. Zeitung von 1785. S. 64. 1786. S. 2. ꝛc. beschrieben. D. Ueb.

Digitized by Google

ſowohl, als auch die größere Länge der Zeit und der höhere Grad der Sorgfalt und Mühe, welche die Erziehung aus den Saamenkörnern erfordert, und die beſonders beym Zerſchneiden und Auslegen ganzer Saamenkartoffeln wegfallen, ſchreckt die ireländiſchen Landwirthe eigentlich allgemein von der Kartoffelſaat ab.

In der Regel braucht man in England weder die kleinſten noch die größeſten Kartoffeln zum Einlegen, ſondern die von mittler Größe: weil die erſtern beſonders wenig oder gar keine Kraft zum Treiben der Keime haben. Freylich thun diejenigen Landwirthe am beſten, welche die größten Kartoffeln und zwar einzeln und ungeſchnitten in den Acker legen, weil dergleichen Saatkartoffeln nicht nur weit mehrere Wurzeln treiben und mithin mehrere Knollen anſetzen, ſondern auch eine beträchtliche Menge Saatkartoffeln erſpahrt werden: denn von den Kartoffeln mittler Größe muß man gewöhnlich zwey bis drey in ein Loch legen *), je nachdem ſie größer oder kleiner ſind. Ueberdieß wachſen auch alsdenn die Kartoffeln ſelbſt größer.

Sehr vortheilhaft und weislich iſt daher die Methode einiger Landwirthe, daß ſie eine Umwechſelung

*) Allein auch von den Mittelkartoffeln iſt ein Stück, welches drey bis vier Augen (ſ. Taf. 3. aa und bb) hat, ſchon hinreichend für ein Loch, indem dieſe eine ſehr faſerige Wurzel, mit mehrern knotigen Anſätzen zum Wachſen der Kartoffeln treiben wird, wenn nur der Boden gut und klar zubereitet worden iſt. In Teutſchland pflegt man gemeiniglich nur ein Stück zu nehmen.
D. Ueb.

Digitized by Google

mit den Setz- oder Saatkartoffeln vornehmen, indem sie von den im Gartenlande erbaueten Kartoffeln ihre Saatkartoffeln zum künftigen Einlegen in das freye Feld, und von den im Felde gewonnenen Kartoffeln die Setzkartoffeln für die Gartenerbauung wählen *). Auf diese Weise erhalten sie immer neue Setzkartoffeln für den dazu bestimmten Boden, und der Ertrag ist eben so reichhaltig als wie derjenige ist, welchen man durch die Umtauschung aller Gartensämereyen erlanget.

Hr. Whyn Baker in Ireland machte einen Versuch mit mittelmäßig großen und mit kleinen Kartoffeln, um das Verhältniß des Ertrages bestimmen zu können und da fand er, daß er in einem Boden von gleicher Güte und gleicher Bearbeitung von einem Pfunde

mittelmäßig großer	84 Pfund 3 Unzen
und von den kleinen Kartoffeln	64 — 12 —

einärndtete, mithin von letztern 19 Pfund 7 Unzen weniger als von erstern.

Nach den von Young, einem berühmten Landwirthe, mit den büschel- oder traubenartigen Kartoffeln, s. oben No. 17. S. 15., angestellten, und in Society Transf. Vol. 3. and 4. beschriebenen Versuchen ärndtete er in verschiedenen Boden auf

einem

*) Dieß thun auch einige teutsche Landwirthe. s. Riem Quartalschrift 1781. S. 191.

Digitized by Google

einem Acre *)		360 Büſhels **)
—	—	328 —
—	—	390 —
—	—	277 —
—	—	150 —
—	—	550 —
—	—	422 —
—	—	350 —
—	—	356 —
—	—	224 —
—	—	250 —
Mithin auf 11 Ackern		3657 Büſhels
Im Durchſchnitt alſo auf jeden Acker		332 Büſhels.

Hingegen zu Caſtle Oliver in der Grafſchaft Limerik wurden 900 Büſhels auf einem Acker gewonnen.

Weit geringer hingegen iſt der Ertrag von den eingelegten zerſchnittenen Kartoffeln; und doch ſind

*) Der engländiſche Acker oder Acre wird zu 4 Farding Deal, 160 □ Polen oder Ruthen, 4840 □ Yards oder 43,560 □ Fuß gerechnet, welche 285 $\frac{1}{10}$ Rheinl. □ Ruthen oder 38,376 franz □ Fuß betragen. Der Quadratfuß beträgt 144 engl. Quadrat Inches oder Zoll, welche 126 $\frac{5}{9}$ franz Quadratzoll betragen.

**) Nach einer Parliamentsacte ſoll der engliſche Buſhel 2178 engliſche oder 1801 franz. Cubikzoll enthalten und 78 $\frac{2}{3}$ Pfund Avoirdûpois Gewicht an ſüßem Waſſer wiegen, ſo daß ſich vergleichen

51 $\frac{2}{64}$ Dresdner } Scheffel mit 152 $\frac{7}{12}$ engliſchen
100 Berliner } Büſhels.

das Zerschneiden der Kartoffeln oder die zerschnittenen Kartoffelstücke, s. Taf. 4. No. 1 bis 6, allenthalben in Irland bey den Landwirthen zur Erziehung dieses Gewächses gebräuchlich und sie haben unter ihnen allgemein den Namen: Saamenkartoffeln, erhalten. Der Gutsherr ist anderer Meynung und nennt sie ohne Unterschied zerschnittene Kartoffeln — cuttings — oder Setzlinge — sets —

Die besten Arten dieser Setzlinge erhält man von den größten Kartoffeln, indem man beym Ausschneiden der Augen oder beym Zerstückeln der Kartoffeln, s. Taf. 4., an jedem Stücke so viel Fleischtheile, z. B. bis zur Stärke eines halben Zolls wenigstens, läßt, s. Taf. 4. No. 1. 2. 5 und 6., daß davon jedes Auge während des Keimens nicht nur, sondern auch eine kurze Zeit des ersten Wachsens seine Nahrungssäfte ziehen, eine faserige Wurzel in die Erde schlagen und einige Sprößlinge oder Zweige in die Höhe treiben kann. Wiederholte Versuche haben bewiesen, daß jemehr von dem Kartoffelfleische mit jedem Auge ausgeschnitten wurde, desto stärker *) die ersten Schößlinge, Sprößlinge oder Zweige und desto frischer und lebhafter der Wuchs waren. Hingegen wenn man Stücken ohne Augen, s. Taf. 4. No. 3 und 4 einlegte, so verweseten dieselben in der Erde und trieben, weder Sprößlinge noch Wurzeln.

Uebri-

*) Anderer Meynung ist der Hr. Com. R. Riem in s. Oekonom. Quartalschrift 1787. S. 191. in der Anmerkung.

Uebrigens iſt eben keine große Kunſt und Geſchicklichkeit zum Zerſchneiden der Kartoffeln nöthig, ſondern man muß nur genau darauf acht haben, daß das Meſſer nicht zu dicht an den Anfang des Auges kommt, weil daſſelbe ſonſt nicht treiben kann. Aus dieſem Grunde ſind die kleinen Kartoffeln, ob man ſie jetzt ſchon allgemein wählt, um die größern zur Speiſe zu erhalten, zum Zerſchneiden ganz unbrauchbar und befördern die ſchnellere Ausartung guter Kartoffelarten. Zudem geht ja von großen Kartoffeln das übrigbleibende, keine Augen habende Fleiſch, ſ. Taf. 4. No. 3 und 4, nicht verlohren, ſondern nachdenkende Landwirthe kochen es entweder zu Brey für Menſchen oder zum Futter für Schweine und Federvieh, und roh füttern ſie daſſelbe theils den Pferden, theils dem Rindvieh. In allen dieſen Fällen aber iſt es ein überaus nahrhaftes Futter.

Wenn die Kartoffelſtücke ausgeſchnitten worden ſind, ſo muß man vorzüglich dafür ſorgen, daß ſie weder in große Haufen aufgeſchüttet werden, noch lange übereinander liegen, weil ſie ſich ſonſt zu leicht erhitzen und dadurch zum Ausſtecken unbrauchbar werden.

Sowohl die zur Einſaat beſtimmten ganzen Kartoffeln, als auch die zum Zerſchneiden beſtimmten, werden weit ſicherer in einem froſtſichern, luftigen, trokkenen Zimmer oder Keller, als in den bekannten Erdgruben aufbewahrt, weil ſie in letztern nicht nur eine allzugroße innere Kälte behalten, welche das Aufgehen

verspätet, sondern auch und zwar hauptsächlich weit häufiger verderben.

Innerhalb der zwey bis drey letztverflossenen Jahre haben mehrere glückliche Versuche der Landleute, in der Nachbarschaft von Limerik bewiesen, daß die aus den im Hause oder in Erdgruben aufbewahrten Saatkartoffeln beym Eintritte der warmen Witterung hervorbrechenden weißen Würzelchen — strings — wie sie die dasigen Pächter nennen, oder Keime, recht gut die Stelle der Kartoffelstücke vertreten, so daß sie dadurch eine beträchtliche Menge Kartoffeln erhielten, welche sonst in Stücke zerschnitten werden müßten. Allein dergleichen ausgekeimte Kartoffeln sind zum Verspeisen unbrauchbar, hingegen bey der Viehfütterung und bey der Brandtweinbrennerey vorzüglich leisten sie vortrefliche Dienste. Nach dem Zerschneiden müssen die Kartoffelstücke einige Tage dünn ausgebreitet liegen, damit die abgeschnittenen Seitenflächen gleichsam eine Rinde erhalten.

Beym Auslegen dieser Keime müssen jedesmahl zwey bis vier Keime in ein Loch gelegt werden, sonst erhält man wenig Kartoffeln. Auch hat man mit gleich glücklichem Erfolge versucht, schon völlig in die Höhe von 3 bis 4 Zoll erwachsene Zweige von den Stöcken loszureißen und zu verpflanzen.

Nichts destoweniger erfordert diese neue Methode *) auf jedem Fall besondere Geschicklichkeit und Aufmerk-

*) In Teutschland sind ebenfalls Versuche dieser Art gemacht worden. s. Hr. Com. Riem s. Quart. Schrift für 1787. S. 192. D. Ueb.

Digitized by Google

merkſamkeit im Verpflanzen, um keine Fehler zu begehen, welche große Nachtheile bey der zu erwartenden Aerndte bringen; und überhaupt ſind dergleichen neue Verſuche bey der Wichtigkeit des Kartoffelbaues, der ein ſo nothwendiges Nahrungsmittel liefern ſoll, nicht gleich als allgemein nachahmungswürdig zu empfehlen, wenn es ſchon nicht zu bezweifeln iſt, daß bey einer eigenthümlichen geſchickten Behandlung durch dieſe Keime gute Aerndten erhalten werden möchten.

Uebrigens iſt noch zu befürchten, daß dieſe Methode bey fernern Verſuchen nicht die überwiegenden Vortheile bringen dürfte, welche ſie einer allgemeinen Ausübung würdig machten, indem man beſorgen muß, daß die Vertheidiger derſelben nicht genug Rückſicht auf die innere Güte der Kartoffeln genommen haben. Denn um dergleichen Keime zu erlangen, müſſen die Saatkartoffeln durch Wärme in einen gewiſſen Grad von Gährung kommen, wodurch ſie viel von ihren Nahrungsſäften und lieblichem Geſchmacke verliehren, und durch das Abbrechen der Keime erhalten ſie Verwundungen, welche den Kartoffeln, ſobald man genöthigt iſt, auch dieſe zu legen, nachtheilig an dem Treiben der Keime ſind.

Endlich ſind auch einige Verſuche gemacht worden, die Kartoffeln ein viertel bis einen halben Zoll dick abzuſchälen, und von den abgeſchälten Schaalen drey bis vier Stücke mit Augen in ein Loch zu legen, woraus man eben ſo gute Aerndten als von den Kartoffelſtücken erhalten haben will. Das Abſchälen

selbst unternimmt man zu Ende Februars und März, in den Abendstunden, wo man ohnehin nichts vornehmen kann, und streuet sie dünn auf luftige Boden, bis man sie zum Pflanzen braucht.

Allein alle diese Ersparungsmethoden haben den großen Fehler, daß sie die Ausartung der Kartoffeln befördern, wenn sie auch reichhaltige Aerndten bringen sollten. Man erlaube mir, dem Uebersetzer, in Ansehung des letztern sehr richtigen Zweifels des engländischen Landwirths, die von den Herren Brunner und Cramer, im Canton Zürch, bereits 1773 gemachten Erfahrungen, hier einzuschalten, weil sie sowohl in diesem Stücke, als auch überhaupt wegen des Kartoffelbaues sehr belehrend sind.

Man maaß neun Plätze in gleicher Lage und von gleichem Boden, jeden zu 57 Quadratschuh ab, und theilte einen jeden, mit einer Nummer versehenen Platz in sechszehen Löcher oder Stuffen ein. In diese Löcher steckte man Kartoffeln von allerley Größe, von den ausgestochenen Erdbirnaugen oder Keimen an, bis zur größten ganzen Saatkartoffel, nach dem Gewicht und wog nachher im Herbste den Ertrag eines jeden Platzes, der übrigens gleich gut behandelt und abgewartet worden war.

Auf dem Platze No. 1., welchen man mit ausgestochenen Kartoffelaugen, je drey und drey in ein Loch, besteckt hatte, erhielt man im Herbste nur drey Pfund Kartoffeln.

Der

Der Platz N. 2. wurde mit den kleinſten Kartoffeln beſaamet, drey in ein Loch, und gab ſechs Pfund Aerndte.

Auf dem Platze No. 3. ſteckte man etwas größere Kartoffeln, ein Stück in ein Loch, wovon man neun Pfund erhielt.

In jedes Loch des Platzes No. 4. hatte man drey Stücke von den aus großen Kartoffeln geſchnittenen Stücken gelegt und überhaupt ſechszehen Pfund geärndtet.

Der Platz No. 5. hingegen ward mit mittelmäſig großen ganzen Kartoffeln belegt, ein Stück in jedes Loch und erhielt vierzehn Pfund Kartoffeln.

Auf dem Platze No. 6. brauchte man von der rothen runden Art, ſ. oben No. 9. S. 14, in ein Loch ein Stück ganz große, und erhielt zwey und zwanzig Pfund.

In jedes Loch des Platzes No. 7. legte man von den langen rothen Kartoffeln, ſ. oben S. 10. No. 6. zwey ganze Stück und ärndtete ein und zwanzig Pfund.

Der Platz No. 8. iſt mit runden weißlichrothen oder blaßrothen Kartoffeln, ſ. oben S. 10 No. 7, in jedes Loch ein Stück, belegt worden, und hat zwanzig Pfund geliefert.

Auf

Auf dem Platze No. 9. wurden weiße lange Frühkartoffeln, s. oben No. 5. S. 10. ein Stück in jedes Loch gelegt und davon zwey und zwanzig Pfund geärndtet.

Der schlechteste Saamen verhielt sich also zu dem besten in Ansehung des Ertrages, wie 3 zu 22 oder ohngefähr wie 1 zu 7, folglich ärndtete man von großen ganzen welche man im Frühlinge auspflanzte, 22 Simri *), indem man von ausgestochenen Keimen auf eben diesem Platze nur 3 Simri und von den kleinsten Kartoffeln 6 Simri erhielt.

Die Ausartung der Kartoffeln besteht hauptsächlich: a) in den kleinern Knollen, b) in dem weit schlechtern Geschmacke und c) in der sehr geringen Aerndte. Die Haupturſachen der Ausartung sind, daß die meisten Landwirthe

1) einen jeden Boden ohne Unterschied zum Kartoffelbaue wählen, er mag gedüngt oder ungedüngt, trocken, feucht oder naß seyn, hoch oder tief liegen.

2) daß man zu Saatkartoffeln die schlechtesten und kleinsten wählet, die großen insgesammt zerschneidet, beym Zerschneiden die Augen beschädigt und die zerschnittenen Stücke nicht vorher genug auf den Aussenseiten abtrocknen oder verhärten läßt; daß man

3) Aus

*) Ein Simri ist der achte Theil des Scheffels, welcher 7835 franz. Cub. Zoll enthält, so daß sich 100 dergleichen Scheffel mit { 51 1/4 Dresdn. / 100 Berliner } Sch. vergleichen. D. Ueb.

3) Aus Futtermangel das Kartoffelkraut ſchon lange vorher, ehe die Saamenäpfel ausgewachſen und die Kartoffeln in der Erde ausgebildet ſind, abſchneidet; daß man

4) Als den gewöhnlichen Einärndtezeitpunkt den Michaelistag allgemein angenommen hat, da man doch auf die Verſchiedenheit der Kartoffelarten ſelbſt hierbey Rückſicht nehmen ſollte, indem einige erſt im October recht zu wachſen anfangen; daß man endlich

5) unter den Kartoffelarten gute und ſchlechte Arten untereinander, und zwar allgemein zu enge pflanzt, wodurch die guten durch die Vermiſchung des Blühtenſtaubes von Jahr zu Jahr ſchlechter werden müſſen.

Um alſo dieſe ſchädliche Ausartung zu verhüten, muß jeder Landwirth

1) den zum Kartoffelbau beſtimmten Boden ſorgfältiger als bisher behandeln, wovon im vierten Abſchnitte mehr geſagt werden wird;

2) große Kartoffeln von guten Arten wählen, dieſelben ganz legen und jährlich mit den Saatkartoffeln wechſeln.

3) Das Kartoffelkraut nie eher von den frühzeitigen als 14 Tage vor Johannis, und von den ſpätreifen 14 Tage nach Michaelis abſchneiden.

4) Die Kartoffeln nicht eher auszuhacken, als bis ſie eine etwas rauhe und dicke Schaale haben und nach

dem

Digitized by Google

dem Abkochen in Wasser inwendig mehr mehlartig als seifenartig sind.

5) Niemals schlechte und gute Sorten, besonders nicht weiße und rothe auf einem und ebendemselben Felde unter einander pflanzet.

In Ansehung der Menge, welche man sowohl von ganzen als zerschnittenen Kartoffeln auf einen irelándischen Acker braucht *), herrscht eine große Verschiedenheit. Wenn die Beete mit dem Spaten umgegraben werden, so nimmt man auf einen Acker nur acht Barrels **) von 21 Stein, den Stein zu 14 Pfund gerechnet, und zu einem engländischen Acker nur fünf solcher Barrels; aber wenn die Kartoffeln mit dem Löcherpfluge oder Cultivator gelegt werden, so braucht man kaum die Hälfte des Saamens.

In der Grafschaft Durham ***) und besonders um die Hauptstadt gleiches Nahmens, nimmt man auf

*) Dieser hat mit dem engländischen einerley Flächeninhalt.

**) Der Barrel wird eigentlich nur von flüßigen Waaren, als Wein ꝛc. gebraucht, und 2 derselben machen einen Hogshead aus, der 12,034 französische Cub. Zoll enthält.

***) Bekanntlich wird England in 7 besondere Landschaften oder angelsächsische Königreiche 1) Esser, 2) Kent, 3) Sussex, 4) Westsex, 5) Ostangeln, 6) Mercia und Northamberland und diese wiederum in 40 Grafschaften — Shires or Countries — eingetheilt; das Fürstenthum Wallis in 12 Grafschaften; das Königs-

auf einen Acker gewöhnlich ſechszehn Büſhels und macht die Reihen zwey bis drey Fuß, die Löcher in denſelben aber nur einen Fuß weit von einander.

Hr. Bower aus Nottingham *) in der Grafſchaft gleiches Nahmens nahm auf den Acker, in deſſen dritte Furche er jedesmahl die Kartoffeln vier Zoll weit auseinander legte, ſieben Sack. **)

In der Grafſchaft Suſſex hat man als das richtige Verhältniß achtzehn Büſhels und in Wiltſhire von vier und einen halben bis zu ſechs Sack für jeden Acker angenommen.

In North Riding legt man funfzehn Büſhels auf einen Acker und in den Furchenreihen zehn Zoll weit von einander.

Auf der Inſel Man, wo man die Lazybeete eingeführt hat, braucht man auf einen Acker achtzehn bis zwanzig Büſhel.

Hr. May zu Suffolk in Oſtangeln pflanzte in Reihen zu 2 Fuß funfzehn Büſhels auf einen Acker.

Hr.

nigreich Schottland hat 33 Grafſchaften mit Inbegriff der orkadiſchen und ſhetländiſchen Inſeln, und das Königreich Irland in d n 4 Haupttheilen Leinſter, Ulſter, Connaught und Mounſter 32 Grafſchaften. So liegt daher Durham in Northumberland und

*) Nottingham in Mercia.

**) Ein Sack, welcher in der Regel nur von der Wolle gebraucht wird, hält 3 Büſhels.

Der Ueberſ.

Digitized by Google

Hr. Billingsley schnitt die größten Kartoffeln in 2 Stücke und pflanzte acht Sack, jeden von 240 Pfund, dergleichen Stücke auf einen Acker, und Hr. Whimpey brauchte von ganzen Kartoffeln sieben und dreyßig und einen halben Büshels, von Kartoffelstücken aber nur zwanzig und einen halben Büshels auf einen Acker.

Hr. Thomas Beevor endlich machte folgenden sehr genauen Versuch. Er nahm

1) funfzehn ganze Kartoffeln, am Gewichte 3 Pfund 6 Unzen, pflanzte sie auf 60 Quadratfuß Land und ärndtete davon ein, neun Stein, zehn Pfund.

2) Funfzehn Kartoffeln von demselben Gewichte pflanzte er auf 45 Quadratfuß und erhielt vier Stein, drey Pfund.

3) Sieben und eine halbe Kartoffel, 1 Pfund 11 Unzen am Gewicht, legte derselbe in funfzehn zerschnittenen Stücken auf 60 Quadratfuß und gewann drey Stein, fünf Pfund.

4) Eben so viel Kartoffelstücken von gleichem Gewichte legte er in einen Raum von 45 Quadratfuß und bekam nur zwey Stein, zehn Pfund. Endlich

5) funfzehn in sechs und vierzig Stücke zerschnittene Kartoffeln, 3 Pfund 6 Unzen am Gewicht, wurden von ihm in einen Raum von 92 Quadratfuß gepflanzt und gaben zehn Stein, ein Pfund Ertrag. Hiervon legte er besonders No. 1, 2 und 5 auf

die

Digitized by Google

die Auſſenſeiten der Furchenreihen und er ſowohl als andere erhielten allemahl größere Aerndten davon als aus den inwendigen Seiten der Furchen.

Vierter Abſchnitt.

Von der Auswahl des Boden.

So wie ſich nicht jeder Boden zum Waitzen, Gerſte und Bohnenbaue ſchickt, eben ſo wenig paßt ein jedes Erdreich für den Kartoffelbau, es müßte denn dem Landwirthe einerley ſeyn, ob er gut ſchmeckende oder ſchlechte, in der Art bleibende oder ausgeartete Kartoffeln erbauen wolle.

In der Regel wachſen nur gute Kartoffeln in einem trockenen Boden: denn im feuchten und naſſen werden ſie wäßrig und ſchliffig und verliehren ihre mehligte Eigenſchaft. Auch wachſen oder gedeyhen ſie nicht in einem tiefen und fetten blauen Thone, Corkaßboden genannt, am Fluſſe Shannon in Ireland.

Die beſten Erdarten zum Kartoffelbaue ſind:

1) alte Wieſen, Lähden und Hutungsplätze, welche man beſonders in Ireland am liebſten dazu nimmt und an die armen Einwohner zum Kartoffelbaue ſehr hoch verpachtet, indem gewöhnlich für eine Ruthe von 16 ½ engliſchen Quadratfuß jährlich 2 Schilling und für einen Acker 16 Pfund bezahlt wird.

Hr. Kirby in Suffolk gewann auf dergleichen Boden ohne alle Düngung 400 Büſhels von einem Acker; und zu Knutsford in Cheſhire erhielt man in einer umgegrabenen alten Lähde 500 Büſhels von einem Acker.

2) Moorigter, ſumpfigter und bergigter Boden aller Art wenn er lange unbebaut gelegen, ſtark bemooßt und nicht naß iſt, werden in den zu Südſchottland gehörigen Grafſchaften Dumbarton, Weſt- und Oſtlothiam, in Roxburgh, in Perth ꝛc. gebraucht. So erhielt man z. B. auf Drey von Beſempfrieme — Spartium Scoparium — und Ginſter, — Geniſta — gereinigten Aeckern, 900 Büſhel ohne Düngung; Hr. Leſſie in Irland in einem ausgetrockneten Sumpfe, 320 Büſhels auf einem Acker; und Hr. Sturt zu Brownſea in einem ſchwarzen Torfmoore 600 Büſhels vom Acker.

3) Waldboden. In dergleichen von Holz geradetem Boden düngte Hr. Abdy in Eſſex, Ehrenmitglied der Ackerbaugeſellſchaft einen Acker mit 20 Fuder Miſt und ärndete davon 563 Büſhels.

4) Auch in junge Hölzer und Baumſchulen haben Lord Clive in der Grafſchaft Schropſhire und Hr. Coke zu Holkham in Norfolk den armen Einwohnern erlaubt drey Jahre Kartoffeln zu pflanzen und ſowohl die Aerndten waren gut, als auch die Bäume hatten vortreflichen Wuchs.

5) Ein guter fetter Lehmboden überall im Königreiche.

6) Ein

6) Ein mit Sand vermiſchter guter Lehmboden.

7) Ein mit bindenden Erdtheilen vermiſchter Sandboden und

8) ein ſandiger leichter Kiesboden oder Flugſand.

Hr. Townley zu Belfield hat beſonders mit den vier letztern Erdarten Verſuche gemacht und in jede vier Augen von den Cluſters oder büſchelarti-Kartoffeln gepflanzt ſ. oben No. 17. S. 15. Der Erfolg war, daß er von No. 5 erhielt 34 Pfund.

— 6 — 29 —
— 7 — 19 —
— 8 — 15 —

Fünfter Abſchnitt.

Von den verſchiedenen Düngerarten.

Jede Art von Dünger oder Düngererde, die den Boden verbeſſert, iſt zum Kartoffelbaue brauchbar; wenn man ſchon nicht läugnen kann, daß guter und fetter Miſt, die beſte Düngung ſey. Allein hierbey iſt noch zu merken, daß diejenige Landwirthe, welche mehr mehlige als wäßrige und ſchliefige Kartoffeln erbauen wollen, ſich des zu fetten Miſtes enthalten müſſen. In einigen Gegenden von England werden zwar dergleichen klebrige und wäßrige Kartoffeln, die man daher auch ſchliefige oder

wachsartige nennt, den trockenen und mehligten vorgezogen, welche man in Ireland so vorzüglich schätzt. Auf diesem Fall darf der Landwirth nicht in Sorgen seyn, diesem Verlangen ein Gnüge zu leisten, wenn nur sein Boden stark mit fettem Mist gedüngt ist.

Da diese Erdfrucht bis itzt meistentheils nur wie jedes andere Küchengartengewächs gebauet und auf mancherley Art künstlich zubereitet gespeiset worden ist, so war es den Leckermäulern ganz gleichgültig, ob sie schliesigte oder mehligte genossen; allein für diejenigen, welche die Kartoffeln als ein Ergänzungsmittel des Brodtes anbauen müssen, haben die trocknen und mehligten einen entschiedenen Vorzug.

Die für einen ireländischen Acker nöthige Menge Mist besteht in einhundert und sechszig einspännigen Pferdekarren und für einen engländischen Acker ohngefehr einhundert; allein auch hierinnen finden in Ansehung des verschiedenen Düngers große Abweichungen statt. So braucht man z. B. in Cheshire oder Chester zu Mercia gehörig auf den gesetzmäßigen Acker 20 bis 40 Tonnen, am Werth für jeden Acker 3 bis 4 Schilling. Das Ausbreiten des Mists geschieht vor dem letzten Pflügen oder zwischen dem Rühren und der Saatfurche.

Zu Aveley in Essex kommen 10 Fuder frischer Dünger auf einen Acker.

In Westmoreland zu Northumberland gehörig nimmt man auf den Acker von 6760 Quadrat

drat Yards, deren jede 9 □ Fuß, oder 1296 □ Zoll hält, 100 Fuder Miſt, und vermiethet alsdenn die Perch oder Ruthe von 272 ½ engliſchen □ Fuß für 2 Schilling zum Kartoffelbaue.

In North Riding fährt man 10 bis 15 Fuder auf einen Acker.

In Mittellothian zu Südſchottland gehörig, wird der Dünger über das ganze Feld dick ausgebreitet; und in der ſüdſchottländiſchen Grafſchaft Berwick hingegen auf einen Acker 15 bis 25 Fuder in die 2 bis 3 Fuß weit von einander abgeſonderten Furchen ꝛc.

Die verſchiedenen Düngerarten ſind:

1) Zu Pulver gemahlener Gyps, der ſehr viel wohlſchmeckende Kartoffeln lieferte.

2) Gebrannter Kalk, entweder für ſich allein oder mit Erde vermiſcht aufs Feld geſtreut, verſchaft ſehr viele und angenehm ſchmeckende Kartoffeln, beſonders wenn er mit Gaſſenkoth oder Steinkohlenaſche vermiſcht wird, wodurch man zugleich bewirkt, daß die auf die Kartoffeln folgende Frucht ungemein gedeyhet. Gewöhnlich nimmt man 1 ½ Büſhel Kalk auf die Ruthe.

3) Mergel, beſonders derjenige, deſſen Hauptbeſtandtheile aus Kalk beſtehen.

4) Seeſand und Torferde.

5) Ruß.

6) Holz- und Seifensiederasche.

7) Sägespähne.

8) Gärberlohe.

9) Ginster- und Farnkräuter.

10) Meergras und Moose; allein die Meer- und Seegräser, welche sehr stark zur Düngung der Kartoffelfelder eingesammelt werden, muß man nicht lange in der freyen Luft liegen lassen, weil sie sonst zu viel von ihren düngenden Eigenschaften verliehren würden, sondern sogleich entweder unterpflügen oder untergraben.

11) Alle Arten von Stalldünger der vierfüssigen Thiere.

12) Federviehdünger.

13) Das Abschwenden oder Abbrennen der Erdhölzer z. B. Heydekraut, Heydelbeerkraut ꝛc. ꝛc. ist eine vortrefliche Mode den Acker zum Kartoffelbau geschickt zu machen und mit der erhaltenen Asche zu düngen.

14) Abgeschälte Raasen, welche man mit dem Schäl- oder Raasenpfluge s. Taf. 1. wo der ganze Pflug und dessen Theile abgebildet und die Längenmaaße angegeben sind, abschält und entweder zerrottet oder in Asche verwandelt zur Düngung braucht. Allein die letztere Düngungsart wird jetzt wenig angewendet, weil die Guthsbesitzer dieselbe aus guten Gründen nicht mehr erlauben, indem dadurch der

frucht-

Digitized by Google

fruchtbarſte Boden ſelbſt verringert würde. Allein in ſumpfigen und mooſigten Boden hält man das Abſchwenden nicht für ſchädlich, weil hier der dicke Raaſen durchs Verbrennen und durch den Kartoffelbau erſt zum Fruchtbau geſchickt gemacht wird.

So viel man auch mit Recht gegen das Raaſenabſchälen und Verbrennen eingewendet hat, ſo glaubt Hr. Kirkpatrik doch, daß es eine vortrefliche Art ſey rohes Land in guten fruchtbaren Acker zu verwandeln, nur tadelt er die öftere Wiederholung auf einem und eben demſelben Acker, weil dadurch der Fruchtbarkeit allein geſchadet würde. Auch die Einwendung, daß abgeſchwendeter Boden allemahl arm an fruchtbaren Theilen ſey, iſt ihm deswegen nicht gegründet, weil der abgeſchwendete Boden ſchon an ſich etwas unfruchtbar wäre und durch die nachherige Behandlung es in noch höhern Grade würde. Denn man habe die Gewohnheit auf einem abgeſchwendeten Boden dreymahl hintereinander zu ärndten, ohne aufs neue zu düngen; und dadurch ſauge man eigentlich das Land aus; ſobald man aber zur nächſten Saat wiederum dünget, entſtünden auf keinem Fall üble Folgen aus dem Abſchwenden. Ueberdiß könne man ja dem Kalke und beſonders dem Mergel eben dieſen Vorwurf machen. Denn die täglichen Erfahrungen beweiſen, daß Felder, welche ſelten unter acht Jahren gemergelt werden und unter der Zeit keinen andern Dünger erhalten, in weit ſchlechtern Zuſtand gerathen, als ſie vor der erſten Bemergelung ſich befanden. Durch das jährliche Umpflügen und

Besäen wird ein dergleichen Acker aller seiner Pflanzennahrungssäfte dergestalt beraubt, daß er nicht einmahl zwey Zoll hohes Unkraut hervortreiben kann.

Obschon in den mit verschiedenen Düngerarten angestellten nachstehenden Versuchen die Menge des Düngers nur durch den unbestimmten Ausdruck: Last, Ladung oder Fuder — Load — ohne Beyfügung des Gewichts oder Maaßes angegeben worden ist, so verdienen diese Versuche doch hier eine Stelle und können vielleicht manchen teutschen Landwirth zu weitern Untersuchungen über die Kräfte der Düngung veranlassen.

Ein ungenannter Landwirth düngete s. Reports S. 13 ff. einen Acker mit 53 Fudern gewöhnlichem Dünger

		und ärndtete davon	400 Büshels.
ein. Acker	m. 160 Büsh. Ruß	— 360	—
—	m. 160 — Holzasche	— 240	—
—	m. 32 Fud. gut. Düng.	— 280	—
—	m. 42 — — —	360	—
—	pflanzte er ungedüngt und erhielt nur	180	—

Ein anderer Landwirth nahm

zu einem Acker	32 Fuder Dünger oder Mist und 40 Büshels Holzasche u. ärndtete ein	400	Büsh.
auf einem Acker	ohne Dünger	— 280	—
zu einem Acker	160 Büshels gelöschten Kalk und erhielt	380	—

zu einem Acker 1½ Tonne oder 30 Centner

		Gerſtenſtroh u. bekam dav.	300	Büſh.
—	—	340 Büſh. Pottaſche —	380	—
—	—	32 Fuder Miſt —	400	—
—	—	32 — dergl. mit 160 Pfund Salz vermiſcht gab	400	—
—	—	32 — dergl. mit 160 Büſhels Kalk vermengt brachte herv.	480	—
—	—	32 — dgl. m. 480 Gallons *) Urin vermiſcht gab	520	—

Nach den von Hrn. Young angeſtellten Verſuchen haben die verſchiedenen Düngerarten folgende Wirkungen gethan:

	im erſten Jahre	im zweyten
Ein Acker ohne Düngung lieferte an Kartoffeln	120 Büſh.	140 Büſh.
Ein Acker gedüngt mit 10 Fud. Moor oder ſchwarzer Erde gab	600 —	640 —
Ein Acker mit 6 Fud. dergl. —	650 —	500 —
— mit 2 — —	500 —	300 —
— mit 10 — Hornſpähnen	650 —	640 —

*) Ein Gallon hält 2 Pottles, 4 Quarts und 8 Pinten oder 231 engliſche und 191 franz. Cub. Zoll, am Gewicht aber 8 Pfund 5 Unzen Avoirdüpois-Gewicht ſüßes Waſſer und 31½ Gallons machen ein Barrel.
D. Ueb.

Digitized by Google

	im ersten Jahre	im zweyten Jahre
Ein Acker mit 6 — dergl.	640 Büsh.	560 Büsh.
— mit 2 — dergl.	560 —	240 —
— mit 60 einspännigen Pferdekarren Saumist	480 —	300 —
— mit 30 dergl.	480 —	160 —
— mit 60 einspännigen Fuder zusammengehäufelter Düngererde aus dem Hofe gab	300 —	240 —
— mit 120 dergl. —	480 —	300 —
— mit 30 dergl. —	140 —	140 —

Hr. Barber verglich den Mist mit der Düngung von alter Wellerwand und verfaultem Stroh. Vom Miste erhielt er auf einem Acker 637, von der Wellerwand 320 und vom verfaultem Stroh 255 Büshels Kartoffeln.

Auffer der Düngung unterstützt den Ertrag des Kartoffelbaues nichts so sehr als der Fruchtwechsel, und man hat daher mit Recht sowohl die Abwechselung des Bodens, als auch des Saamens zur Vermehrung dieses Gewächses empfohlen. Jeder Landwirth, der nur einige Kenntniß des Bodens hat, wird die vorzügliche Güte des frischen und neuen Bodens bey Erziehung aller Gewächsarten anerkennen müssen. Doch kennet Hr. Kirkpatrik in seiner Nachbarschaft zwey Stücke Land, wovon das eine 14 Jahr und das andere über 28 Jahr hintereinander mit Kartoffeln bepflanzt worden sind, ohne daß sich eine Verminderung

der

der Aerndte gezeigt hätte. Im Gegentheil verſichern die Eigenthümer dieſer Ländereyen, daß ſie itzt ſowohl in Anſehung der Menge und Güte noch eben ſo viel Kartoffeln einärndteten, als das erſte Jahr, wo ſie dieſelben zu dieſem Endzwecke beſtimmten.

Zu Aveley in Eſſex nimmt man Waitzenſtoppeln, beſäet ſie im Herbſte mit Winterwicken und Raygras zum Frühjahrsfutter, und nach dem Abhüthen pflügt man das Feld um und läßt es mit Kartoffeln bepflanzen, worauf im November die Aerndte folgt, der Acker aufs neue geſtürzt und im folgenden Frühjahre mit weißen Früherbſen bepflanzt wird, die grün in London verkauft werden.

Zu Fulham und Edmonton in Mittel Eſſex ſäet man nach den Kartoffeln Waitzen; und in Suſſex, nahe bey Battle, folgen die Kartoffeln ungedüngt in Waitzenſtoppel.

In Weſtmoreland zieht man beym Kartoffelbaue die Haferſtoppel vor.

In der zu Weſteſſex gehörigen Grafſchaft Wiltſhire nahe bey Larington folgen

1) auf Kartoffeln
2) Waitzen,
3) Gerſte und
4) Klee zum Abmähen und Winterfutter.

In Oſt-Riding folgen

1) Kartoffeln,

2) Wai-

2) Waitzen,
3) Hafer, Gerste oder Erbsen.

Auf der Insel Man sind auf einem Grundstücke von 180 unter dem Pflug getriebenen Aeckern 24 Acker mit Kartoffeln besaamt und die Ordnung ist

1) Kartoffeln,
2) Gerste,
3) Klee,
4) Waitzen,
5) Hafer, Erbsen oder Bohnen.

Auf dem trockenen hochliegenden Boden in Mittel-Lothian in Südschottland folgen

1) Kartoffel, gutgedüngt,
2) Waitzen,
3) Klee, und
4) Hafer.

In Renfrewshire, zu Südschottland gehörig, folgen

1) Hafer, in die Braache
2) Kartoffeln.
3) Hafer,
4) Braache mit Futtergräsern besaamt.

In Roxburgshire oder Tiviotdale, ebenfalls in Südschottland ist die Kartoffelärndte im zweyten Jahre sowohl in Ansehung der Menge, Güte und Größe besser als im ersten.

In

In Selkirk in Südſchottland erbauet man auf

1) Kartoffeln,
2) Gerſte und
3) Gräſerey oder Braache.

In Tweedale ebendaſelbſt ſäet man nach den Kartoffeln Gerſte.

In Herefordſhire, in der Provinz Mercia, hat Hr. Yeard in lehmigtem und thonigtem Boden

1) Erbſen oder Bohnen nach dem Klee,
2) Waitzen,
3) Kartoffeln,
4) Waitzen und
5) Hafer und Klee erbauet.

Zu Rychope, nahe bey Sunderland in der Grafſchaft Durham folgen nach dem Hafer

1) Braache,
2) Kartoffeln,
3) Waitzen oder Mazelin,
4) Turnips,
5) Gerſte,
6) Kartoffeln,
7) Waitzen,
8) Zur Grasnutzung auf 5 oder 6 Jahre.

Digitized by Google

Sechster Abschnitt.

Von den verschiedenen Arten der Feldbestellung zum Kartoffolbaue und dem Pflanzen der Kartoffeln.

Beym Kartoffelbaue bedient man sich in Großbritannien einer achtfachen Feldbestellung, als:

1) Das Pflügen in Deckbeete.

2) Durch die Säemaschine oder den Löchermachenden Pflug.

3) Durchs Graben mit dem Spaden.

4) Durchs Hacken.

5) Durch die Pferdehacke.

6) Durchs Unterpflügen über oder unter den Dünger.

7) Nach Art der Hopfenberge; und

8) unter die Bohnen.

Um für eine reichliche Aerndte irgend eines durch menschliche Mühe und Arbeit erzeugten Erdgewächses zu sorgen, ist die vorhergehende Bearbeitung des Bodens durchaus nothwendig, und jedes Gewächs erfordert wegen seiner Eigenschaften eine besondere ihm nur allein anpassende Behandlung und Bearbeitung des Feldes. Aus diesem Grunde dürfte ein zum Waitzenbau sehr gut bestelltes Feld vielleicht zur Gersten- und Haafersaat ganz unbrauchbar seyn, und das Feld, welches Haafer in Menge hervorbrächte, dürfte den Hofnungen des Landmannes beym Kartoffelbaue nicht entspre-

sprechen. Auch Personen, welche nur noch auf der niedrigsten Stuffe landwirthschaftlicher Kenntnisse stehen, wissen schon, daß eine verschiedene Behandlung, Bearbeitung und Düngung des Bodens zum Kartoffelbaue nothwendig ist, wenn man eine gute Aerndte machen will.

In der Regel bleibt für Landwirthe, die ein Gespann Pferde haben, das Pflügen immer noch die wohlfeilste, wenn schon nicht die beste, Feldbestellungsart beym Kartoffelbaue, indem man nicht nur weniger Kosten, sondern auch nur ein Drittheil des Düngers nöthig hat, welcher zum Graben gebraucht wird, um eine und mehrere gute und einträgliche Aerndten zu machen.

1) Die erste und einfachste Feldbestellung, welche erwähnt zu werden verdient, ist das Pflügen in Deckbeete — Lazybed method — welches man in Irland allgemein, in Schottland in den mehresten Grafschaften und in England nur in wenig Gegenden angenommen hat, indem man hier den Löcherpflug vorzieht. Sie kann jedoch bloß auf alten Wiesen, sehr fetten Lähden und Weideplätzen und in moorigten, sumpfigten Boden und in gebürgigten steinigten mit Vorsicht und glücklichem Erfolge angewendet werden.

A. Im Februar oder März wird die Lähde ꝛc. mit dem Pfluge in gerade Beete von gleicher Breite dergestalt abgezeichnet, daß zwischen denselben Zwischenräume ungepflügt für größere Graben oder

Fur-

Furchen — trenches — liegen bleiben. Nach der verschiedenen Beschaffenheit des Bodens kann man den Beeten eine Breite von drey und einen halben bis fünf Fuß geben. Wäre die gute Ackererde seicht oder flach, so muß man die Beete schmahl machen, weil alsdenn in einem solchen Boden aus den Furchen oder Graben von mäßiger Breite nicht genug gute Fruchterde herausgenommen werden könnte, die Beete hinreichend zu bedecken. Wenn aber die gute fruchtbare Erde eine beträchtliche Tiefe hat, so kann man die Beete breiter anlegen, doch sollen sie demohngeachtet die Breite von 5 Fuß nicht übersteigen. Die Breite der Graben sollte mit Rücksicht auf diese Feldbestellung immer etwas mehr als den dritten Theil der Beetebreite betragen: denn nach dieser Ackerart erfordern die Kartoffeln mehr klahre Fruchterde zu ihrer Bedeckung als bey jeder andern.

Wenn die Beete und Zwischenräume zu den Graben so in Linien oder Reihen der Länge nach angelegt und mit dem Spaden bezeichnet worden sind, so muß man den Mist oder eine andere Düngung gleichförmig in die tiefen Streifen der gepflügten Beete ausbreiten. Alsdenn nimmt man zur Legung der Kartoffeln in den Dünger Jungen oder Mägdchen, welche dieselben so viel es nach bloßem Augenmaaße geschehen kann, in gleich weiten Entfernungen auslegen. Die beste und richtigste Weite für diese Saatkartoffeln ist neun Zoll, allenfalls bis ein Fuß.

Nachdem die Raasen auf den bezeichneten schmahlen Zwischenräumen der Graben abgeschält, mit dem

Spa-

Spaden zerkleint und über die gelegten Kartoffelſtücken geworfen worden ſind, ſo wird hierauf ein flaches Grabſcheit voll klarer Fruchterde aus dem Graben auf die Beete über die zerhackten Raaſen geſtreuet, um dadurch die erſte Bedeckung für die Kartoffelſtükken zu bilden. Die Hälfte jedes Beetes wird immer von der zunächſt liegenden halben Seite des Grabens bedeckt. Wenn nun die gelegten Kartoffelſtücke ohngefähr zwey Zoll lange Stängel über der Erdoberfläche getrieben haben, ſo wirft man abermahls einen zweyten ſeichten Grabſtich voll Erde über dieſelben; und ſobald ſie auch dieſe Decke durchbrochen haben und einige Zoll hoch auf der Oberfläche erſcheinen, bedeckt man ſie endlich noch einmahl ſo ſtark durch Schaufel und Spaden mit Erde. Bey dieſer letzten Erdbedeckung müſſen die Seiten der Graben ein wenig zerhackt, ganz glatt geebnet und der Grund oder das Bette derſelben gut gereinigt werden, damit von der klaren Erde nichts in denſelben zurückbleibt.

Einige Pächter bedienen ſich anſtatt des Grabſchelts beym letzten Bedecken in den Graben eines gemeinen Pfluges ohne Streichbret, Skeleton Pflug genannt — im Teutſchen Ruhrhaaken — ſpannen in gewöhnlichem Erdboden ein Pferd, in feſten und zähen aber zwey davor und lockern durchs Ruhren in den Graben die Erdkrume auf und ſchaufeln alsdann die ſolchergeſtalt aufgelockerte Erde über die Beete. Wo an irgend einer Stelle wegen der Seichtigkeit des fruchtbaren Bodens Gefahr ſeyn dürfte, durch den zweyten Spadenſtich die untere Schicht eines ſchlech-

ten Thons, sauern Lehms oder magern und ausgehungerten Sandes, der dann und wann mit dem zweyten Spadenstiche erreicht wird, herauf zu bringen, daselbst muß das Ruhren der Graben gewählt werden, weil die äusserste Sorgfalt anzuwenden ist, nichts von diesem schlechten Boden auf die Kartoffelbeete zu bringen. Die Pächter oder Landwirthe hiesiger Gegend haben für dergleichen unfruchtbare Erde einen eigenen Nahmen und nennen sie vergiftende Erde — poisons the ground — wegen des Schadens, der durch das Auswerfen derselben verursacht wird.

Es mag nun der Spaden oder der Ruhrhaaken zum Auflockern der Fruchterde in den Graben gebraucht werden, so muß man die letzte Erdbedeckung schlechterdings von den Seiten und vom Berte der Graben nehmen, damit dieselben zierlich aussehen und von aller aufgelockerten Erde gereiniget sind.

Solchergestalt werden alle die nothwendigen Vorarbeiten bey dieser zum Kartoffelbaue angenommenen Ackermethode bis auf die geringe Sorgfalt, das Kartoffelfeld vom Unkraute rein zu halten, beendigt seyn. Der Umstand des Erdbedeckens zu zwey verschiedenen Zeiten nach dem ersten Erscheinen der Pflanzen trägt besonders viel zur Unterdrückung des Unkrauts bey; und das schnelle Wachsen der Kartoffeln selbst nach dem letzten Bedecken verschaft ihnen bald die Oberhand über jedes Unkraut, welches nach dem ersten Jäten hervorzukeimen versucht.

Nichts destoweniger müssen auch die unter den Kartoffeln erscheinenden Unkräuter zu jeder Zeit ausgerot-

gerottet werden, sobald als sie nur hervorkeimen. Die beste Zeit zu dieser Arbeit ist unmittelbar nach dem Regen. In solchen Beeten, die wir beschrieben haben, kann man ohne die jungen Pflanzen zu verletzen immer zu den Unkräutern kommen, indem die Jäter längst den Graben gehen, in welche sie das ausgezogene Unkraut werfen, damit es daselbst verdorren kann.*) Und da besonders die Beete nicht über fünf Fuß breit seyn dürfen, so können die Jäter, gleichviel ob Jungen oder Mägdchen, immer bequem bis in die Mitte eines jeden Beetes jäten.

Wenn die Lähden oder Viehtriften oder alte Wiesen und Grasepläße auf diese Weise mit Kartoffeln bepflanzt worden sind, so wird jeder Landwirth wohlthun dieselben Felder auch für das nächstfolgende Jahr zum Kartoffelbaue zu bestimmen. Denn die im vorigen Jahre auf die Beete gebrachte Raasendecke wird während der Zeit so vollkommen gerottet seyn, daß sie anstatt des vortreflichsten Düngers dienet, und der Boden überhaupt wird durch den Kartoffelbau im zweyten Jahre weit vollkommener zerkrumet werden und dadurch ein weit vortreflicheres Feld zum Kornbaue abgeben, als nach dem ersten Jahre.

Im zweyten Jahre muß man dafür sorgen daß die Furchen oder Graben da angelegt werden, wo im ersten Jahre der Mittelpunkt der Beete war und folg-

*) In Teutschland sammelt man dasselbe weit sicherer ein, wäscht es von Sande und Erde rein und braucht es zur Fütterung, weil sonst manches wiederum mit den Wurzeln in die Erde eindringen und fortwachsen dürfte.

D. Uebers.

Digitized by Google

lich muß der Mittelpunkt der letztern dahin kommen, wo im ersten Jahre der Mittelpunkt der Graben war. Diese Abwechselung verschaft durch das sorgfältigere Auflockern und vollkommenere Vorbereiten des Bodens nach der zweyten Kartoffelärndte einen weit ergiebigern Ertrag in der Kornärndte.

Noch muß hier als eine Verbesserung dieser Feldbestellung zum Kartoffelbaue angemerkt werden, daß man die Beete und Graben oder Erdbänke im Winter oder spätestens im Februar anlege; und sobald als beyde angelegt worden sind die Graben so tief als die fruchtbare Erde steht, umzugraben und das obere oder die Grasseite der Raasen unten lege, sie selbst aber mit dem Spaden zerstückele. Wenn nun die Raasen vermischt mit der klahren Fruchterde aus dem Graben in diesem Zustande bis zum Einlegen der Kartoffeln rotten, so wird die ganze Erde der Graben eine vorzügliche Güte erlangen und mit größerm Nutzen auf die Beete geworfen werden können.

B. Eine zweyte und in der That bessere Methode dieser Feldbestellung, (welche der so eben beschriebenen immer vorgezogen werden sollte, wenn es anders der Bequemlichkeit der Landwirthe angemessen wäre) ist die zum Kartoffelbaue bestimmte Lähde irgend einmahl im Frühlinge so zeitig als möglich — denn je früher desto besser — in Beete von der gedachten Breite mit dem Taf. 1. oder No 1. befindlichen Pfluge umzupflügen. Allein wo der gute Boden eine erträgliche Tiefe hat, daselbst ist die eigentliche

liche Breite der Beete ſieben Fuß vom Mittelpunkte der einen Abtheilungsfurche bis zum Mittelpunkte der andern; iſt aber der Boden ſeicht, ſo muß auch hier die Beetbreite ſchmähler ſey. Ehe man den Pflug in dieſe Grasplätze bringt, muß man alles Gras ſorgfältig abweiden laſſen.

Das Pflügen ſelbſt muß auf eine ſehr genaue und vollkommene Art dergeſtalt geſchehen, daß die Raaſen durch den Pflug ganz glatt umgewendet werden und keine Grasſpitze zu ſehen iſt. Wenn der Pflüger die zweyte Furche auf dem Beete anfängt, muß er gerade nur ſo viel Raum neben der erſten laſſen, als mit dem abgeſchnittenen Erdſtreifen glatt bedeckt werden kann, ohne daß die zweyte Furche auf der erſtern liege oder gar über ſie hinausrage. Auf dieſe Weiſe wird jeder umgepflügte Streifen mit den glatt liegenden Raaſen bedeckt und in den Raum des vorher ſeitwärts umgewendeten Raaſens zu liegen kommen.

Wenn die Beete alle ausgepflügt ſind, ſo muß man ſie der Länge nach eggen um jede Unebenheit gleich zu machen und die offenen Rinnen da, wo die Raaſenränder zuſammenſtoſſen mit klarer Erde auszufüllen. In dieſem Zuſtande läßt man das Feld bis zum Pflanzen der Kartoffeln liegen und der während der Zeit umgewendet liegende Raaſen wird verfault ſeyn und als eine Art Dünger dienen können. Nichts deſto weniger muß man doch noch etwas Dünger hinzufügen; und in dieſem Falle iſt gut gefaulter, kurzer und fetter Miſt der beſte, wenn man ihn haben

kann; was es aber auch für Dünger seyn mag, so muß ihn der Landwirth erst kurz vor dem Einlegen der Kartoffeln aufs Feld bringen und daselbst die Haufen in verschiedenen Entfernungen abladen, damit er bequemer, leichter und gleicher auf die Beete ausgebreitet werden kann.

Die Menge des Düngers s. ob. Abschn. 4. überhaupt hängt nothwendig immer von der verschiedenen Güte des Bodens ab. Denn in dem Verhältnisse, wie der Boden mager oder fett gefunden wird, muß man, wie leicht zu erachten ist, auch mehr oder weniger Dünger anwenden. Uebrigens versteht sich noch von selbst daß bey der zu bestimmenden Menge von Dünger sowohl auf die Beschaffenheit des Bodens als auch des Düngers Rücksicht genommen werden muß. Auch brauchte man hier wohl kaum noch anzuführen, daß je besser der Dünger ist, desto weniger man davon nöthig habe. Vorausgesetzt daß alle andern Umstände gleich sind, so wird man auf ein Feld, daß nach der eben gedachten Art eine Zeitlang vor der Pflanzungszeit umgepflügt worden ist, wegen der verrotteten Raasen nicht so viel Dünger nöthig haben, als bey der vorher unter A. angezeigten Feldbestellung.

So wird auch eine auf die unter B. beschriebene Art bestellte Lähde oder alte Wiese, die man zwey bis drey Monat vor dem Einlegen der Kartoffeln bestellt hat, ohne irgend einige Düngung zu erhalten, eine sehr gute Kartoffelärndte liefern.

Die

Die Saatkartoffeln oder Kartoffelstücken werden auf folgende Weise in diese Beete gelegt: Jeder Arbeiter muß mit einem vor sich angebundenen Schurzfelle oder kurzen weiten Sacke versehen seyn, worein er die Saatkartoffeln schüttet. Mit einem Spaden sticht er in die Erde, so weit sie aufgelockert ist, beugt ihn mit der linken Hand vorwärts, damit eine Oeffnung entsteht und greift mit der rechten Hand unterdessen nach den Kartoffeln, legt sie in den Spalt, zieht den Spaden wiederum heraus und bedeckt die ganze Oeffnung mit Erde.

Der Spaden, welchen man zu dieser Absicht in Ireland gemeiniglich braucht, ist von dem in England gewöhnlichen Spaden s. Taf. No. 2. unter dem Buchstaben D. verschieden. Er hat anstatt der zwey Auftritte nur einen zum Aufsetzen des rechten Fusses; das schmahle Eisen ist nur halb so breit als wie bey dem englischen, und die ganze Länge desselben mit Inbegriff des Stiels sechs Fuß; so daß dieser Spaden ein ungemein leichtes Werkzeug ist. Die irelandischen Arbeiter dürfen sich beym Gebrauche ihres Spadens nicht so tief bücken als wie die englischen bey ihrem kurzen Handspaden; und die Länge des Eisens ist gerade so groß als die Kartoffeln Tiefe erhalten müssen, zu welcher derselbe wegen seiner schmalen Gestalt durch eine leichte Anstrengung des rechten Fußes willig eindringet. In Ireland haben die Landleute, Männer und Weiber, Jungen und Mägdchen von 14 und 15 Jahren große Geschicklichkeit und Geschwindigkeit beym Kartoffellegen erlangt.

Die Spalte oder Löcher werden in einer Linie querüber nach regelmäßigen gleichweiten Entfernungen auf den Beeten gemacht und zwar legt man in die Beete von 5 Fuß Breite fünf Saamenkartoffeln oder Kartoffelstücke, wodurch jede Pflanze von der andern eilf Zoll entfernt bleibt. Die nächste in die Quere gemachte Löcherreihe steht von der ersten einen Fuß weit entfernt, und so fährt man fort, bis das ganze Beet bepflanzt worden ist. Sechszehn Männer oder Weiber sind nöthig einen irelandischen Acker in einem Tage auf diese Art zu pflanzen; und zu einem englischen Acker braucht man zehn Arbeiter.

Unmittelbar nach dem Pflanzen läßt man die Beete der Länge nach eineggen, damit alle die Spadenlöcher vollends verschlossen werden.

In einigen Theilen von Ireland bedienen sich die Landleute anstatt der eisernen Spaden kurzer Pflanzhölzer, die sehr zugespitzt und mit einem Fußtritte zum Einstoßen in die Erde versehen sind; allein die Anwendung des eisernen Spadens ist vorzuziehen, weil die Erde mehr aufgelockert wird.

Wenn der Landwirth in Ireland wegen zu vieler Arbeit den Mist oder andere Düngung nicht zu rechter Zeit vor dem Kartoffelpflanzen aufs Feld fahren kann, so läßt er die Kartoffeln vorher einlegen und darf von der angenommenen Meynung nichts fürchten, als würde der ohngefähr eine Woche oder zehn Tage nachher auf dergleichen vorher besaamte Felder, wie sie dieselben nennen, ausgefahrne und gebrei-

breitete Miſt nachtheilige Folgen bey der künftigen Aerndte zeigen. Allein er muß alsdenn beym Ausfahren des Düngers nur leichte Pferdekarren brauchen und damit bis zum Durchbrechen der Pflanzen den Dünger ausfahren. Demohngeachtet iſt es entſchieden der beſſere Weg die Düngung, von welcher Art ſie auch ſeyn mag, vor dem Einpflanzen der Kartoffeln auf die Beete zu bringen, indem doch immer nachher auch bey dem leichteſten Fuhrwerke der Boden in einem gewiſſen Grade feſt und derb zuſammengetreten wird; — ein Umſtand, den man ſo viel als möglich vermeiden muß.

Die nächſte bey dieſer Feldbeſtellung zu verrichtende Arbeit iſt, dergleichen vorher beſaamte Beete mit klarer Fruchterde aus den Furchen zu bedecken, in welchen ſie ein auf und niedergehender Pflug aufgelockert hat, damit ſie bequemer ausgeſchaufelt werden kann. Dieß muß ſo geſchwind als möglich nach dem Ausfahren und Ausbreiten des Düngers geſchehen, damit die Düngung durch zu langes Liegen an der Sonne und durch Wind und Regen nichts von ihren düngenden Kräften verliehret. Nachmals werden die Graben eben ſo wie unter A. S. 48. gezeigt worden iſt, an den Seiten abgeſtochen und rein ausgeſchaufelt und die erhaltene klare Fruchterde zwey Zoll hoch über die erſte Bedeckung geworfen, wobey aber auch dafür geſorgt werden muß, daß man keine ſchlechte Erde aus der Tiefe der Gräben ausgräbt. Uebrigens dürfen nach Verhältniß der Beetbreite die Graben bey dieſer Methode nicht ſo breit gelaſſen werden

wie unter A. weil man zur Bedeckung der Beete nicht so viel Erde braucht, indem die Kartoffeln unter die Erde und den Mist und bey der Methode A. über den Mist gelegt werden.

Wenn ein armer ireländischer Bauer einen halben oder ganzen Acker Lähdeland zum Kartoffelbaue besitzt und kein Vertrauen zur Lazybeetemethode hat, indem er sich keinen Pflug zum umreissen desselben miethen kann, so gräbt er das Ganze mit dem Spaden um und legt die Kartoffeln auf die bereits beschriebene Art ein. Obschon diese Methode weit besser als das Pflügen ist, weil der Boden dadurch mehr aufgelockert wird, so ist sie doch zu kostspielig und langweilig, als daß sie allgemein angenommen werden dürfte.

C. Eine dritte Feldbestellung und Pflanzungsart ist die Kartoffeln in ein nach der unter B. angezeigten Methode gepflügtes Stoppelfeld zu legen. Freylich ist das Stoppelfeld weder so reich an Nahrungssäften noch hat es so viel Treibekräfte als wie eine frisch umgebrochene Lähde und wird daher mehr Düngung erfordern. Hierbey ist das Beste, den Dünger, von welcher Art er sey, so zeitig als möglich im Frühjahre auf die Stoppel zu fahren, auszubreiten und unterzupflügen. Hierauf werden die Saatkartoffeln oder Stücke zur rechten Zeit nach der bereits angezeigten Richtung eingelegt und aus den Graben zweymahl mit klarer Erde bedeckt, wie wir dieß alles oben S. 55. unter B beschrieben haben.

Als

Als eine allgemeine Regel muß hierbey bemerkt werden, daß jemehr der Boden durchs Pflügen und Eggen vor dem Einlegen der Kartoffeln aufgebrochen, aufgelockert und Nahrungsſäfte einzuſaugen geſchickt gemacht wird, und jemehr Düngung ſich unmittelbar mit dem Boden vereinigen kann, deſto größer und einträglicher die Aerndte iſt; und der auſſerordentliche Ertrag wird die größern Aufwandskoſten fürs Pflügen und Eggen nicht nur bereits durch eine reiche Kartoffelärndte ſondern auch nach den Kartoffeln durch eine größern Kornertrag erſetzen.

Hr. Parkinſon auf Doncaſter hat das gewöhnliche Pflügen und Umgraben mit der Lazybeetemethode unter A und B verglichen und folgenden Unterſchied gefunden. Nach der Lazibeetemethode erhielt er von einem Acker 2904 Pecks *)
nach der gemeinen Pflug- und Grabeart 1210 — —
mithin nach der erſtern Art 1694 Pecks
mehr Ertrag.

2) Die zweyte Hauptbeſtellungsart der Kartoffeln geſchieht mit der Säemaſchine oder dem Löchermachenden Pfluge — Drill - plough — welcher gegenwärtig in England als ſehr beliebt in allgemeinen Gebrauch zu kommen ſcheint, da er viele Vorzüge für den Beetepflügen und dem Umgraben mit dem Spaten hat. Die Drillmethode erfordert weniger

*) Vier Pecks machen einen Büſchel aus; und ein Peck enthält 2 Gallons, 4 Pottles, 8 Quarts und 16 Pints. D. Ueb.

Digitized by Google

ger Menschen, ein großer Gegenstand schon für den irelándischen Landwirth, aber ein noch größerer für die englánoischen Landwirthe, wo die Arbeiter seltener sind und das Gespann theurer zu stehen kommt. Man braucht weniger Dünger, ein neuer wichtiger Umstand für die Landwirthe, deswegen, weil durch eben denselben Aufwand nicht allein mehr Kartoffeln erbauet werden können, sondern auch nach der Kartoffelárndte mehr Land zum Kornbau geschickt gemacht wird.

Wenn es dem Vortheile der Landwirthe nicht angemessen ist, unmittelbar nach der Kartoffelárndte Waitzen in das Feld zu säen, wie dieß allgemein in Ireland, wo der Boden mittelmäßig gut ist, zu geschehen pflegt, so wird derselbe Acker im nächsten Frühjahre nach vorhergegangenem einmaligen Pflügen und Eggen sehr gut zum Gerstenbaue vorbereitet seyn. In den unfruchtbaren und gebürgigten Gegenden von Ireland säet man Hafer in das Kartoffelland und erbauet dadurch den besten Hafer.

Die Stoppelfelder sind am geschicktesten zum Kartoffelbaue nach der Drillmethode. So bald als es sich thun läßt, pflügt der Landmann die zu diesem Behuf bestimmten Stoppeln, vollendet diese Arbeit so geschwind als möglich, gleichet jede alte Furche aus und macht das ganze Feld eben. In diesem Zustande bleibt das Feld den Winter durch liegen. Beym ersten trockenen Wetter wird das Feld im Frühlinge aufgeegget und dann unmittelbar darauf in die Queere gepflügt, stets aber muß dafür gesorgt werden, den Acker weder zu

pflü-

pflügen noch zu eggen, wenn er naß iſt. Dieſe zweyte Pflugart wird eigentlich mit dem Wendepfluge — turn-wrisplough — verrichtet, und ſo, daß man alle Furchenſtreifen nach einer Richtung umwenden oder umlegen läßt. Es iſt dieß zwar nicht weſentlich nothwendig, aber es erleichtert die folgende Mühe des Ebenmachens des Feldes. Kurze Zeit darnach muß der Acker noch einmal geegget und gleichgemacht werden, ſo daß derſelbe zu Anlegung der Löcher geſchickt wird. Man hat kaum nöthig zu erwähnen, weil es bekannt iſt, daß, wenn es auf dem Acker eine ſteile Anhöhe giebt, die Löcher müſſen gerade auf und nieder laufen, denn auf eine andere Art würde die eine Seite der Löcher nicht genug mit dem Pfluge klar gearbeitet werden können. Wenn der Acker entweder völlig oder doch gröſtentheils eben iſt und die Gränzen deſſelben es zulaſſen, ſo iſt die beſte Art die Löcherreihen genau von Norden nach Süden zu anzulegen, damit die Pflanzen der Sonne mehr ausgeſetzt ſind.

Die Löcher werden durch einen in der Furche auf und niedergehenden Pflug gemacht; und in dieſem Falle legt das Streichbret erſt die Erde auf die eine und denn auf die andere Seite. Sie müſſen vollkommen gerade und ſo tief als es der Boden zuläßt, vier Fuß weit von einander gemacht werden, damit man die Kartoffeln zu wiederholten Malen mit Erde durch den Pflug bedecken kann.

Die zum Einlegen der Kartoffeln angenommenen Jungen oder Mägdchen legen dieſelben ſobald als das

zwey-

Digitized by Google

zweytemal gepflügt worden ist, einzeln in die sechs Zoll auf jeder Seite von einander entfernten Löcher, damit die Kartoffeln Raum haben zwischen den Löchern sich auszubreiten. Unmittelbar nach dem Einlegen der Kartoffeln müssen dieselben mit Mist oder anderer Düngung bedeckt werden. Sowohl die Bestimmung der Menge des Düngers als auch die gleiche Ausbreitung desselben muß dem eigenen Urtheile des Landwirths überlassen werden. Es würde eben so lästig als unnütz seyn, hier in Kleinigkeiten wegen der besondern Leitung dieses Geschäftes sich einzulassen. Wenn nicht Mist oder anderer Dünger zu haben ist, so muß das gepflügte Feld gut mit Kalk gedünget werden und man wird eine reiche Kartoffelärndte erhalten. Nach dem Einlegen der Kartoffeln in die Löcher und ihrer Bedüngung hat man zur Bedeckung derselben verschiedene Methoden befolget.

Einige lassen auf der einen Seite den Pflug herauf und auf der andern herunter gehen und bedecken daher mit dem Streichbrete die Löcher. Noch andere eggen die Löcher queer über erst mit einem Strauche, dann mit der Egge zu, damit die Eggezinken nicht zu tief in die Löcher eindringen und sowohl die Kartoffeln beschädigen als den Dünger in Unordnung bringen. Endlich giebt es noch eine Methode, welche für die beste gehalten wird. Man füllt nämlich mit einem vier bis fünf Zoll breiten, ohngefähr vier Fuß langen Bretchen, woran ein Stiel, wie beym Rechen, befestigt ist, die Löcher zu. Mit dieser Krücke wird die klare Erde mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit über die Löcher gedeckt, ohne

ohne eine Beschädigung der eingelegten Kartoffeln zu befürchten, und man muß nur den Umstand nicht vergessen, daß in fetten tiefen Boden die Löcher dichter als in mittelmäßigen verschlossen werden sollen.

Wenn die Kartoffelpflanzen etwas über die Oberfläche der Erde herausgewachsen sind, werden sie auf beyden Seiten der Löcher beerdet und so wie sie auch diese Bedeckung überwachsen haben, wiederholt man auf jeder Seite das Anhäufeln der Erde aus den Zwischenräumen der Löcher. Diese Anhäufelung ist den englischen Landwirthen so bekannt, und durch das bisher gesagte, so deutlich gemacht worden, daß es überflüssig seyn würde, darüber hier Vorschriften mitzutheilen; aber die allgemeine Bemerkung hat man noch hinzuzusetzen, daß die Bedeckung mit Erde drey oder viermal gemacht werden muß; und daß man sie entweder so lange fortsetzt bis sie ganz in der Blüthe sind, oder die Zwischenräume noch gute Erde liefern.

Bey der letzten Anhäufelung müssen die Zwischenräume die Gestalt derjenigen erhalten, welche zwischen den Sellerreihen in den Küchengärten sich befinden und die Mitte der Furche in den Zwischenräumen nur so tief als der gute Boden gehen. Während des Wachsens der Kartoffeln halte man sie wie jedes andere Gewächs sorgfältig rein von Unkraut.

Eine andere Art der Drillmethode beschreibt H. Kirkpatrik, wovon der Verlauf folgender ist:

Um es auf die kürzeste Art zu erklären, muß das Land eben so wie zur Gerste gepflügt und geeget werden. Diese Weisung wird meines Erachtens für alle Gegenden Englands hinlänglich seyn. Wenn es in diesem Zustande, und wohl geeget, auch auf der Oberfläche eben gemacht worden ist, so müssen gleich weit von einander stehende Löcher der Länge des Feldes nach gemacht werden. Nachdem der Pflug eine Furche über das Feld gezogen hat, muß er durch das nämliche Stück wiederum zurückgezogen werden, daß er die Erde auf beiden Seiten gleich hoch aufwirft. Diese Löcher müssen so weit und tief seyn, als man sie zur Fassung des Düngers, welcher in jede Oeffnung gelegt wird, geschickt glaubt. Für die Entfernung dieser Löcher muß man eine grade und gleiche Richtung annehmen. Macht es so: daß wenn eure Pferde in einem Loche stehen, jedes Rad eures Karrens oder Wagens in der Mitte des nächsten Loches auf jeder Seite stehet. Wenn ihr so das Ganze zu bearbeiten vorgefahren habt, so ist die nächste Arbeit den Dünger hin zu führen, und wenn eure Pferde in dem einen Loche stehen, und jedes Rad eures Karrens in gleicher Richtung ist, so wird an der Zierlichkeit und Ordnung eures Feldes wenig zu tadeln seyn. Der Dünger muß von eurem Karren in kleine Haufen geworfen werden, hinlänglich die drei Löcher, welche eure Pferde und die Räder eures Karrens innen haben, anzufüllen, und der Mist muß gehörig vertheilt, in die Oeffnung jedes Loches kommen. Dieß kann in kurzer Zeit von Leuten mit zweizackigten Gabeln verrichtet werden.

Diese

Diese sind die bequemsten Werkzeuge zu dieser Arbeit, wenn man sich lang gestreuten Düngers bedient, der neuerlich erst aus dem Kuhstalle herausgeworfen, oder auf den Meierhöfen ist zusammengeschauffelt worden, und nicht gehörige Zeit zum Faulen gehabt hat.

Wenn die Löcher so zubereitet worden sind, legt man die Saatkartoffeln hinein auf den Dünger, ohngefähr jede 6 Zoll von der andern. Der Pflug muß sodann auf beiden Seiten jedes Loches hinlaufen, um mit der aufgepflügten Erde die Kartoffeln zu bedecken. Diese Arbeit wird sie in der Mitte erheben, und verursachen, daß sie auf beiden Seiten schief liegen, wie das Dach eines Hauses.

Nunmehro ist die Arbeit so lange vollendet, bis sich die Kartoffeln über der Erdfläche zeigen. Sodann muß man auf jeder Seite der Kartoffeln mit dem Pfluge auf und nieder fahren, welcher sie beerdet und das aufkeimende Unkraut vernichtet. Dieses aber muß gethan werden, sobald als eine der Pflanzen erscheint: denn, wenn man wartet, bis die ganze Reihe sich über die Oberfläche erhoben hat, so sind wahrscheinlich diejenigen, welche zuerst aufgegangen waren, schon zu einer beträchtlichen Höhe gediehen, und daher in Gefahr abgebrochen oder beschädiget zu werden, wenn man etwas Erde auf sie wirft.

Eine noch andre Art das Wachsthum der Kartoffeln nach dem Pflug in die Höhe zu bringen, ist, wenn man den Boden mit Dünger bedecket, ihn einpflügt, die Beete gegen 7 Fuß breit macht, und dann

die Kartoffeln mittelst eines Pflanzstockes pflanzt, aber sie nicht ganz an den Rand steckt, damit ein Theil desselben mit dem Grabscheite kann abgeschnitten werden, um ihn drüber zu werfen und die Pflanzen zu bedecken, wenn sie so eben erscheinen.

Endlich bedient man sich auch folgender Methode: Man pflüget den Boden in Beete, ohngefähr 7 Fuß breit, dann bedecket man seine Oberfläche mit Dünger, setzet die Pflanzen über denselben, und bedeckt sie mit der Erde, welche von beiden Seiten abgeht, die man in dieser Rücksicht unbepflanzt gelassen hat. Dieses wird den Raum zwischen jedem Beete sehr breit oder tief, oder beides zugleich machen, so wie auch eine beträchtliche Menge Erde liefern, um die Pflanzen zu bedecken, auch wird noch ein Vorrath bleiben für eine zweite Bedeckung, welche nöthig ist, sobald die Pflanzen über der ersten erscheinen.

Dieses nun sind die verschiedenen erprobten Gattungen, eine Kartoffelärndte durch den Pflug empor zu bringen, welches gewiß die wohlfeilste und beste Art für Jedermann ist, welcher ein Gespann hat. Allein, meines Erachtens, ist das Drillen vorzuziehn, weil es, wie gesagt, eine größere Menge Kartoffeln hervorbringt, und, was sehr wesentlich ist, eine geringere Menge Dünger erfordert.

Ich habe strohern ungefaulten Dünger, als das dienlichste beim Drillen empfohlen; und zwar aus dem Grunde, weil er unter allen den geringsten Werth auf des Pachters Ländereien hat, und auf die schnellste Art

in

in den Löchern kann angebracht werden, auch so gut und tauglich ausfüllet, oder noch besser ist, als irgend eine andre Gattung; obschon jede Art Dünger eine Kartoffelärndte liefert. Unter mehrern andern Landwirthen hat besonders Hr. Young den Ertrag verschiedener Kartoffelarten, s. oben Abschn. 3. S. 20. nach der Drillmethode mit einander verglichen und gefunden, daß ihm auf einem Acker

die Cluster, s. oben S. 15. No. 17., lieferten 360 Büshels.

Die Red Nosed Kidney, s. No. 3. S. 13., nur 144 Büshels;

und die Golden Tags, s. oben No. 4. S. 10. aber 207 Büshels.

Die dritte Hauptfeldbestellung ist die Methode, nach welcher man die Kartoffeln durchs Umgraben mit dem Spaten erbauet.

In dieser Hinsicht muß das Land in 7 Fuß breite Beete abgetheilt, und 2 oder 3 Zoll tief mit einem Spaten nach der Schnure gegraben oder zerschnitten, und dabey auf der ganzen Länge eine gleiche Breite beobachtet werden. Ich bestimme die Abmessung der Beete auf 7 Fuß, weil es, meines Erachtens, die schicklichste Breite ist, um die Pflanzen, sobald sie erscheinen, zu bedecken und mit Erde zu bewerfen; ist aber das Feld feucht, so möchte es nützlicher seyn, sie nur 6 Fuß breit zu machen, so wie bey trocknem Boden 8 Fuß Breite anzunehmen.

Digitized by Google

Wenn man das bezeichnete und gleichsam eingerichtete Feld anfängt zu umgraben, muß man vorerst etwas Erde eines Spatens tief und 1½ Fuß in der Länge herauswerfen. Dieser Graben muß auf den Boden ganz eben mit klar gegrabener Erde von dem festen Erdreiche des nächsten Beetes bedecket werden.

Der Dünger wird sodann dünn über diese Erdbedeckung geworfen, worauf wieder in gleicher Tiefe gegraben und auf den Dünger ein Spaten voll Erde geworfen wird. Hierdurch entsteht ein zweiter Graben, welcher auf die nämliche Weise, wie der vorhergehende gefüllt wird; und so verfährt man bis zu Ende des ganzen Feldes.

Bei grünen Rasen trage man Sorge, jeden Spaten voll auf die begraste Seite zu legen, und an die Seite der Beete lege man die grüne Seite gegen die Mitte. Wenn man nicht auf diese Art zu Werke geht, so hindert der Rasen, wenn man die Ränder zum bedecken absticht, und verursacht in diesen Theilen Unkraut. Bey Werfung jedes Spaten voll Erde muß man behutsam seyn, um die Fugen, wie es die Arbeiter nennen (ein Ausdruck, den sie vermuthlich von den Ziegeldeckern entlehnt haben) auszufüllen, d. i. die Erde so hohl, als möglich, zu legen, so, daß die Mitte des letzten Rasens, die Fugen der beiden bedecke, damit nicht einer genau auf dem andern in gleichem Raume liege, welches augenscheinlich den Boden härter und fester als die hier angepriesene Methode machen würde. Sobald man näher an das Ende der Schicht kommt,

muß

muß jeder Spaten Erde flacher gelegt werden, welches wie ich glaube, die Schicht am Ende etwas niedriger, als im Anfange machen wird, welches nothwendig ist, daß in einiger Abstufung sich die Höhe des Grabens verkleinere. Die Erde, welche man im Anfange auswirft, kann man in einem der folgenden Graben gebrauchen, oder wenn sie an's Ende ist hingekarrt worden, sich ihrer daselbst bedienen.

Oft sind Kartoffeln auch in dieser Gegend in grünem Rasen gepflanzt worden. Man hat die Beete auf die so eben beschriebene Art bezeichnet, nur mit dem Unterschiede, daß man zwischen jedem einen Raum gelassen, welcher hinlängliche Erde enthält, um die Hälfte der Beete auf jeder Seite zu bedecken. Der Dünger wird sodann in gehöriger Dicke auf das Hauptbeet gelegt, die Pflanzen in gehöriger Entfernung drauf gesetzt, wornach sie hernach mit der darzwischen liegenden und in dieser Hinsicht aufgesparten Erde bedecket werden. Allein ich glaube, daß dieß nicht sehr gebräuchlich sey, und ich kann aus eigner Erfahrung auch den glücklichen Fortgang nicht versichern, ob ich gleich gehört habe, daß man auf diese Art eine gute Kartoffelärndte erlangen soll; doch weiß ich auch von Niemanden, daß er diesen Versuch wiederholt hätte, welches einen Beweiß mehr gegen diese Behandlung geben möchte.

Die beste Art, zeitig Kartoffeln zu pflanzen, ist, sie auf einen Boden, welcher das vorhergehende Jahr, ohne Zuthuung irgend einer Art von andern Dünger,

mit Mist wohl gedünget worden ist, zu setzen. Der Theil des Gartens oder Feldes, welches man dieser Absicht widmet, muß sorgsam durchgraben, und die Erdklöße, wenn welche vorhanden, mit dem Spaten zerschlagen werden. Die Löcher werden sodann mit einer Hacke oder Spaten in der Entfernung eines Fußes gegraben, die Kartoffeln 6 Zoll tief absonderlich hineingelegt, und sodann mit 4 Zoll hoher Erde bedecket. Ich grabe gewöhnlich diese Löcher mit einem Spaten, und die Erde, welche ich aus dem einen Loche bekomme, deckt die Kartoffeln, welche ich in das vorige Loch gesteckt habe.

Ich wollte es Jedermann anempfehlen, niemals die Kartoffeln abzuschneiden, welche sie sehr zeitig im Frühling pflanzen. Sie sind von sehr zartem Wuchs, daß ihnen der Frost so schädlich, als den Gurkenpflanzen ist. Wenn nur eine einzige Knospe in einem Setzling zurückgeblieben ist, und der Schößling über der Erde durch Kälte gelitten hat, daß er verwelkt, so kann man sicher, ob er sich gleich augenscheinlich erholt, nur eine geringe Ausbeute erwarten.

Wenn die Kartoffel zeitig, im Februar, ist gesetzt worden, welches die Zeit ist, wo ich überhaupt meine Früh-Kartoffeln setze, denn bey dieser Jahreszeit ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Frost so strenge seyn, und sogar die Kartoffeln selbst erreichen werde, ehe sie aufgehen; und sollte sich dieß zutragen, wenn sie sind gelegt worden, so wird der Frost doch nur immer die eine Seite der Kartoffeln treffen und die

unten

unten liegende mit ihren Augen gut bleiben, daher dieſe Augen noch ſehr gute Sprößlinge treiben und eine gute Aerndte liefern werden.

Verſchiedene legen ihre zeitigſten Saatkartoffeln auf eine Tenne, oder in ein andres Behältniß und bedecken ſie mit Sägeſpähnen, Haferſpreu oder jeder andern Art von Spreu. In dieſer Lage laſſen ſie dieſelben lange Schößlinge treiben, und ſchieben das Einſtecken in die Erde ſo lange auf, bis die Witterung anfängt milder zu werden und harte Fröſte nicht mehr zu erwarten ſind, weil man ſie alsdenn mit größerer Sicherheit ſchneiden könne. Ich wollte aber doch Jedermann, der dieſe Art befolgen will, rathen, die Kartoffeln ſehr dünn zu überſtreuen, ſonſt möchten die Sprößlinge ſich umwinden und abbrechen, ſobald man ſie löſen wollte. Sobald man ſie pflanzen will, muß man ſie ſehr behutſam behandeln, und es iſt weit ſicherer, ſie in Löcher zu legen, als ſie mit einem Pflanzſtock in die Erde zu ſetzen. Wenn man ſie auf dieſe Art vorwärts gelegt und unter die Erdbedeckung gebracht, und ſorgſam bey milder Witterung geſetzt hat, ſo kann man hierdurch ſehr zeitige Kartoffeln bekommen. Sie werden ſich wenige Tage nach ihrer Pflanzung zeigen, und ihr Fortgang im Wachsthum wird ſehr ſchnell ſeyn, vorausgeſetzt, daß ſie eine trockne und warme Lage haben, welches in Rückſicht dieſer zeitigen Erzeugung, welche in dem Garten geſchehen muß, überaus wichtig iſt. Allein ich behaupte, daß man noch keine hinlängliche Kenntniß von dieſer Art zeitige Kartoffeln zu erzeugen, habe, ſo daß man

davon einen vollständigen und eigenen Unterricht geben könnte. Ich habe es einigemal versucht, aber gefunden, daß es mit vielen Unfällen verknüpft sey, welche vielleicht von meiner Unwissenheit, den zeitigen Kartoffelbau kunstmäßig zu behandeln, herrühren möchten.

Ich habe vorher erwähnt, daß man die Kartoffeln, die man in breite Beete auf den Feldern gepflanzt hätte, so bald sie über den Boden erschienen, bedecken müsse, und die Vorsichtsregel gegeben, sie in dieser Rücksicht nicht zu nahe an den Rand der Beete zu bringen; aber von dieser Behandlung habe ich noch keine besondere Vorschriften gegeben. Was bisher ist gesagt worden, kann vielleicht hinlänglich seyn, aber doch ist damit nichts mehr gethan, als die Ränder der Beete abzuschärfen und eine geringe Bedeckung von Erde darauf zu werfen, welches das hervorschießende Unkraut sehr verdämmen, die anhaltende Kälte abwehren und die jungen Pflanzen sehr vortheilhaft beschützen wird. Wenn man dieß so lange vernachlässiget, bis die Pflanzen schon einige Zolle hoch sind, so muß man dafür sorgen, daß die Erde nicht heftig drauf, sondern sanft herum gelegt wird. Es ist jedoch immer besser, den Boden zwischen den Reihen der zeitigen Kartoffeln aufzuhauen, oder mit der Hand auszujäten, als ihn zu bedecken.

Ich muß hier nur noch, ehe ich weiter fortfahre, einige Rücksicht auf die Vorbereitung der jungen Saatkartoffeln nehmen: denn da man sie gemeiniglich auf die Seite legt, sobald man sie aus dem Boden genom-

nommen hat, ſo iſt ein kleiner Unterricht von der Art ſie einzuſammeln, nothwendig.

Man hebt die Kartoffeln mittelſt einer dreyzackigen Gabel aus der Erde. Gemeiniglich bedient man ſich in Lancaſhire der Weiber zu dieſer Arbeit, wofür ſie den Tag einen Schilling empfangen; aber vor noch ſehr wenigen Jahren betrug ihr Lohn nur 8 Pfennige. Bey der Einſammlung der Kartoffeln behält man die größten zum häußlichen Gebrauch, die nächſt großen zum Saamen, und die allerkleinſten zum Futter für das Zugvieh, Geflügel oder die Ferkel. Auf jedem Beete ſtehen zween Körbe, worein man in einen die großen Kartoffeln thut, ſobald ſie aus dem Boden genommen werden, in den andern aber, die zum Pflanzen beſtimmten einſammelt, und die kleinſten auf dem Felde auf einen Haufen wirft und zur gelegenen Zeit nach Hauſe fährt. Iſt das Kartoffelfeld groß und viele Leute darauf beſchäftiget, ſo fährt man einen Karren drauf, in welchem die Körbe, welche die gröſſern Kartoffeln enthalten, ausgeſchüttet werden, und die Saatkartoffeln ſchüttet man in Säcke und bringt ſie gemeiniglich, ehe man ſie einwintert, auf eine Dreſchtenne, damit ſie abtrocknen.

4) Die vierte Art der Feldbeſtellung geſchieht mit dem Karſten oder einer zweizinkigen Hacke, womit man das ganze Feld kurz hacket, nachdem es vorhero gepflügt worden iſt. Man bedient ſich dieſer Methode beſonders zu Aveley in Eſſex, und ſetzet die Kartoffeln zehn Zoll auseinander und vier

Zoll tief. Auf einem Acker erbauet man bey dieser Feldbestellung 200 Büshels und drüber. Hingegen Hr. Bucke in Suffolk pflügte das Feld sehr tief im Herbste, bedeckte es mit ein wenig Erddünger, und legte im folgenden Frühlinge die Kartoffeln zehn Zoll weit in die mit dem Karsten gemachten Löcher, wodurch er z. B. von den Pink Nosekartoffeln s. ob. S. 13. No. 3. auf einem Acker 434 Büshels gewann.

5) Die fünfte Art der Feldbestellung und Pflanzung der Kartoffeln geschieht mit der sogenannten Pferdehacke.*) Das Feld wird ebenfalls entweder schon im Herbste oder erst im Frühjahre gepflügt und dann mit der Pferdehacke nach Art der Gärtner zum Einlegen der Kartoffeln rajolt. Man macht ganz schmahle Beete von einigen Fuß breit und läßt zwischen denselben einen eben so breiten Zwischenraum, welcher während des Sommers jedesmahl mit der einspännigen Pferdehacke umgerissen wird, sobald sich Unkraut darauf sehen läßt, um dadurch und auch zugleich durch das öftere Auflockern destomehr Fruchtbarkeit in den Acker zu bringen. Dieser

*) Der Erfinder dieser Feldwirthschaft mit der Pferdehacke war Jethro Tull, ein Engländer, der sie 1723 anfieng und alle seine Getraydefelder damit bestellte und ohne weitere Bedüngung und Brachhaltung besäete. Du Hamel verbesserte bey Einführung derselben in Frankreich manche Fehler des Tull's und teutsche Landwirthe zeigten in den ökonom. Nachrichten B. IV. S. 558 die Nachtheile derselben in Teutschland. Eine sehr weitläuftige Beschreibung mit Abbildungen aller Theile dieses Instruments findet man in Mill's Lehrbegrif der Feldwirthschaft. D. Ueb.

Digitized by Google

ser im Sommer also etliche mahl umgepflügte Zwischenraum wird nachher im folgenden Jahre das Saatfeld und die vorjährige Stoppel wird alsdenn während der Zeit mit der Pferdehacke oft aufgelockert. Nach dieser Art benutzt man seine Kartoffelfelder ohne Dünger eben so hoch wie mit demselben.

Man bedient sich gegenwärtig dieser Methode vorzüglich auf Nord Riding in Yorkshire, wo man die Kartoffeln zwanzig Zoll weit auseinander legt und zu Sandy in Bedforshire, wo sie einen Fuß ins Gevierte gelegt werden.

6) Die sechste Art ist, daß man die Kartoffeln entweder unter oder über den Dünger pflanzet.

In Lancashire, auf Nord Riding und in Annandale pflegt man das Feld zweymahl zu pflügen und zu eggen, alsdenn die Furchen zu düngen und die Kartoffeln nach der Drillmethode vier Zoll tief und acht bis zehn Zoll auseinander zu pflanzen; hingegen in Northumberland und Chester setzt man die Kartoffeln erst in die gemachten Löcher und bringt den Dünger oben darauf. Allein diese letztere Methode ist unter allen die fehlerhafteste, wie nachstehender Versuch allein hinreichend beweisen wird. Hr. Whyn Baker pflanzte zehn Pfund Kartoffeln sowohl über als unter den Dünger und erhielt davon aus den über den Dünger gepflanzten

105 Pfund 4 Unzen.

aus den unter den Dünger 84 — 3 —

mithin weniger 21 — 1 —

und

und die Kartoffeln waren noch oben drein schlechter vom Geschmack.

Man hat auch in England einige Versuche gemacht, die Kartoffeln eben so zu pflanzen wie den Hopfen und auch so zu bearbeiten und anzuhäufeln. Hr. D. Hunter empfiehlt bey dieser Methode zwey bis sechs Kartoffeln kreisförmig vier Fuß ins Gevierte von einander zu pflanzen und um dieselben herum lauter kleine Hügel anzuhäufeln; als wodurch er reichliche Kartoffelnärndten erhalten hätte.

8) Endlich ist man auch darauf gefallen, die mit Bohnen bereits besaamten Felder noch in den Zwischenräumen mit Kartoffeln zu bepflanzen, welche erst alsdenn recht zu wachsen anfangen, wenn die Bohnen bereits eingeärndet worden sind. Man muß gestehen, daß dieß ein sehr vortheilhafter Einfall ist, welchen man Hrn. Hollins verdanket, indem das Feld auf eine doppelte Art dadurch benutzt wird, ohne daß die Bohnen durch die Kartoffeln im mindesten in ihrem Wachsthume gestöhrt werden.

Siebenter Abschnitt.

Von der besten Jahreszeit die Kartoffeln zu pflanzen.

In der Grafschaft Chester hält man den Anfang des März für die rechte Pflanzungzeit, bedeckt aber

aber doch den bepflanzten Acker noch mit Stroh oder Schilf des Nachts bis in die Mitte des May. Ohnweit Penzance pflanzt man die Boskow's Nierenförmige Kartoffeln s. ob. No. 13. S. 11. zu oder vor Weynachten, nimmt sie im Monath May wiederum heraus und bepflanzt eben denselben Acker noch einmahl mit irelándischen Kartoffeln s. ob. No. 13. S. 15. und macht davon im November eine noch einmahl stärkere Aerndte als von erstern.

Zu Aveley in Essex werden die Spätkartoffeln allgemein erst im Junius gepflanzt.

In Lancaster pflegen einige im April, die meisten aber im May und Junius ihre Kartoffeln einzulegen und machen gute Aerndten.

Auf der Insel Man legt man die Kartoffeln vom Ende des März bis in die Mitte des May; aber die im Anfange des May gelegten geben die reichlichsten Aerndten.

In Mittel Lothian pflanzt man die ersten Kartoffeln im April und die letzten im Anfange des Junius, wobey aber die Erfahrung gemacht worden ist, daß die zuerst gepflanzten die besten und mehligsten Kartoffeln liefern.

Uebrigens darf hierbey nicht unbemerkt gelassen werden, daß sowohl die späten und frühen Kartoffeln selbst unter sich als auch der Boden und die Düngung einen großen Unterschied in der Pflanzungszeit erfordern.

Digitized by Google

dern. Besonders gilt dieß vom Boden: denn wenn derselbe viele Thon- und Lehmtheile enthält, so darf man schlechterdings eine und eben dieselbe Kartoffelsorte nicht zu gleicher Zeit in einen mehr mit Sand vermischten Boden und auch in einen mehr thonigten oder lehmigten Boden legen, weil sie in dem letztern ohnfehlbar verderben würde, wenn man mit dem Einlegen derselben nicht noch vierzehn Tage warten wollte.

(Für Teutschland dürfte in den Breitengraden 40 bis 48 auf den nicht gebürgigten Aeckern der Monath April, auf den gebürgigten Aeckern aber und vom 49 Breitengrade an bis zum 54ten die erste Hälfte des Maymonaths und über den 54ten Grad hinaus die letzte Hälfte des May und die erste des Junius die beste Pflanzungszeit seyn, wenn anders die zum Kartoffelbau bestimmten Felder in den letztern Breitengraden nicht etwa Ebenen oder warme eingeschlossene gegen Ost- und Nordwinde geschützte Flächen sind. D. Uebers.)

(Auch muß man jederzeit darauf denken bey trockner Witterung, und wenn es mit Wahrscheinlichkeit vorauszusetzen ist, daß es bald regnen werde, die Einlegung der Kartoffeln vorzunehmen. Denn im Fall die Kartoffeln lange im Boden ohne Regen zu erhalten, liegen müssen, so vertrocknen sie zu stark und mehrere Keime können alsdenn nicht ausschlagen, oder ein großer Theil wird von Ungeziefer beschädigt. Beyde Unfälle verursachen schlechte Aerndten. D. Ueb.)

Ehe

Ehe ich diesen Abschnitt endige, muß ich noch die Meynungen und Erfahrungen des Hrn. Kirkpatrick über die Pflanzungszeit anführen, weil sie mehrere Eigenthümlichkeiten enthält.

Derselbe hat allgemein wahrgenommen, daß in der Gegend um Warrington der Februar oder Hornung die eigentliche Zeit zur Pflanzung der frühen oder zeitigen Kartoffeln sey, und er empfiehlt daher die Mitte dieses Monats, wenn auch gutes Wetter vorzüglich darzu reitzen sollte, sie einige Tage zeitiger zu säen, oder unfreundliches Wetter anrathen dürfte, daß es klüger gehandelt wäre, dieses Geschäft einige Zeit noch aufzuschieben.

Ich halte das Ende des Aprils für die beste Zeit die Spätkartoffeln zu pflanzen. Werden sie früher in's offne Feld gesetzt, so möchten sie Gefahr laufen, von dem Frost beschädiget zu werden; und die besten im April gepflanzten Kartoffelarten haben noch immer hinlängliche Zeit ihre vollkommne Reife zu erlangen. Die Kartoffeln, welche man in Lancashire zeitig säet, dauern vom Ostermond bis zu Ende des Brachmonds, diejenigen aber, welche zu spät im Jahre gepflanzt worden, haben nicht Zeit genug zu ihrer Vollkommenheit zu gelangen: gesetzt auch, daß sie einzig und allein für Ferkel, Zugvieh oder Geflügel bestimmt wären, so ist dieß von wenig Wichtigkeit.

Die Kräuselkrankheit, welche sich oft an den in Locken gedrehten Blättern der Kartoffeln zeiget, und wel-

welche ein gewisses Kennzeichen ist, daß man sehr wenig von den Pflanzen erwarten dürfe, die damit behaftet sind, hat die Aufmerksamkeit der Anbauer dieses Gewächses sehr an sich gezogen, und man hat die Ursache dieses ungünstigen Merkmahls sehr verschiedenen Gründen zugeschrieben. Doch was es auch immer für eine Ursache dieser Krankheit seyn mag, so hat man doch ein Vorbeugungsmittel gegen dieselbe ausfindig gemacht. Nämlich dieses: niemals von den nämlichen Kartoffeln die zwei folgenden Jahre zu säen, d. i. jährlich die Saatkartoffeln zu verwechseln. Man sorge dafür, daß die Saatkartoffeln in einiger Entfernung und auf einem dem zur Kartoffelsaat bestimmten unähnlichen Boden erbaut worden sind, d. h. wenn euer Boden streng und hart ist, so seyd bemüht die Saatkartoffeln von einem leichten und sandigen Boden zu besorgen, und so im umgekehrten Falle.

Diese wichtige Entdeckung ward größtentheils durch Zufall gemacht. Einstmahls, als die Kartoffeln hier einen hohen Preis hatten, kam eine Schaluppenladung aus Schottland zu Liverpool spät im Frühjahr an. Ich kann itzt nicht pünktlich das Jahr dieser Ankunft bestimmen, doch so weit ich mich erinnere, war es etwa vor 20 Jahren. Diese ganze Kartoffelladung war in einem hohen Grade ausgewachsen, und bey der Untersuchung so verwelkt und mürbe, daß man sie für uneßbar hielt, und Niemand dieselben aus diesem Grunde kaufen wollte. Indessen war die Zeit des Kartoffelpflanzens noch nicht vorbey,

Digitized by Google

bey und die Kartoffeln wurden von einigen mit einem geringen Preise bezahlt, um die Pächter zu veranlassen, mit ihnen einen Versuch zum Pflanzen zu machen. Hier bewiesen sie sich nun so fruchtbar und gänzlich frei von der Kräuselkrankheit. Diese Eigenschaft verschaffte ihnen damals so große Vorzüge, daß viele Schiffsladungen jährlich seitdem zum Pflanzen eingeführt wurden, und man findet sie noch unveränderlich, fruchtbar, und vollkommen frei von jenem schädlichen Uebel, wovon wir gesprochen haben. Dieser durch Ohngefähr bewirkte Versuch leitete auf den Schluß, daß die Veränderung des Bodens ein Mittel wider diesen Fehler sey, und der wiederholte Versuch hat eben die glückliche Folge gehabt. Saatkartoffeln aus sumpfigem Boden sind selten diesem Uebel unterworfen; oder wenn man dieselben aus der Ferne besorgt, oder aus einem Boden, von so verschiedner Natur, als nur möglich, den man in dieser Hinsicht bestimmt. Dieß ist also die einzige mir bekannte Art diesem Uebel vorzubeugen. Die Pflanzen, welche das erste Jahr aus Schottland gebracht wurden, hatten keine einzige gekräuselte Pflanze unter sich; wenn man aber einige davon zum Saamen für's andre Jahr aufbewahret hätte, welche das vorhergehende Jahr in der Nachbarschaft groß gewachsen waren, so würden sie erstaunend ausgeartet seyn. Ich ließ mich einmal bewegen, einen Versuch damit zu machen, aber drei Viertheil der Erndte waren gekräuselt. Doch giebt es einige Gattungen von Kartoffeln, welche nie von dem Uebel angesteckt wurden, ob man sie gleich wiederholt auf das nämliche Land pflanzte, welche ich

Digitized by Google

auch besonders in dem Verzeichnisse der verschiedenen Gattungen dieses Gewächses angeführet habe.

Achter Abschnitt.

Von der Behandlung der Kartoffeln während des Wachsens bis zur Aerndte.

Nachdem man die eingelegten Kartoffeln mit der Hand fest in die Erde gedrückt und bedeckt hat, läßt man den Acker ruhig liegen. Allein sobald dieselben eben aufkeimen, wird der Acker bey trockener Witterung geegget, um das zugleich aufkeimende Unkraut zu zerstöhren, welches in trockener Witterung desto besser verdorret. Wenn man hingegen die Kartoffeln in einem Küchengarten erbauet, so nehme man anstatt der Egge die breite Hacke und lockere damit theils den Boden auf, theils zerstöhre man das Unkraut. Wird diese Bearbeitung des Kartoffelfeldes mit der Egge oder mit der Hacke unterlassen, so überzieht das Unkraut die Kartoffeln dergestalt, daß sie der Arbeiter bey dem nachmahligen Behacken nicht leicht finden kann und mit dem Unkraute manche Kartoffel zerstöhret.

Sobald die Kartoffeln eine Hand hoch gewachsen sind, werden sie in trockenem Wetter das erstemahl behackt, d. h. man häufelt das Erdreich von beyden Seiten so hoch an sie heran, als es ihre Höhe erlaubet, und jätet dabey alles Unkraut aufs sorgfältigste her-

Digitized by Google

heraus. Dieſes Behacken kann entweder mit der breiten Hacke und dem Karſten oder mit dem einſpännigen Pfluge ohne Streichbret geſchehen und darf niemahls unterlaſſen werden. Denn in dieſem angeſcharrten Haufen wächſt ſowohl ihre Frucht beſſer und dieſelbe kann auch aus dem über der platten Erde befindlichen Erdhaufen beſſer und leichter ausgenommen werden, ſo daß nicht ſo viele in dem Ackerlande liegen bleiben. Mir ſind verſchiedene Landwirthe bekannt, welche ihre Kartoffeln weder behacken noch anhäufeln ließen, ſondern bloß das große Unkraut ausjäteten; dafür aber erhielten ſie eine über die Hälfte geringere Aerndte als von den behackten Kartoffeln.

Die jungen Kartoffeln wachſen überhaupt nicht aus der eingelegten Saatkartoffel heraus, wie etwa die jungen Zwiebeln des Johannislauchs um die gepflanzte alte und an deren Stelle oder wie etwa um einen auseinander geriſſenen Buſch des Schnittlauchs neue herum wachſen, ſondern an den Wurzelfaſern der aus den Keimen der Saatkartoffeln hervorgeſchoſſenen vielen Zweige. Man findet daher die eingelegte Saatkartoffel noch im Julius und manchmal gar im Oktober faſt ganz unverſehrt oder doch nur erſt etwas angegangen, in der Tiefe ganz allein liegen und die neuen Kartoffeln hingegen befinden ſich gleichſam oberhalb der Oberfläche des Beetes in der angehäuften Erde. Wenn ein ganzer Kartoffelbuſch ausgezogen wird, ſo findet man, daß die jungen Kartoffeln an den Wurzelfaſern eines jeden Zweiges beſonders hängen und vermittelſt der zarten Röhren, gleichſam wie

durch eine Nabelschnur, ihre Nahrungssäfte einsaugen. Je höher demnach der Kartoffelbusch angehäufet wird, desto höher hinauf laufen alsdenn aus den Stängeln die feinen Röhren heraus und setzen die Knollen an, welche also immer im obern Theile der Erdhaufen zahlreicher als in den untern angetroffen werden.

Nachdem auf die erste Hacke ein Regen gefolgt ist, werden die Kartoffeln den Reihen nach vor der Blüthe das zweytemahl behacket und wiederum angehäufelt, so hoch als es die Stängel erlauben. Hierbey ist nöthig auch das Erdreich unter den Wurzeln, so viel als möglich aber ohne Beschädigung derselben aufzulockern.

Endlich muß man nach dem völligen Abblühen der Kartoffeln dieselben zum drittenmahle hacken und anhäufeln, daß die Erdwälle um die Stöcke herum die Höhe von vierzehn bis achtzehn Zoll erhalten. Viele Landwirthe unterlassen diese dritte ebenfalls nach einem Regen anzustellende Hacke, aber dafür erhalten sie auch ein Drittheil kleinere und um die Hälfte weniger Kartoffeln, als diejenigen, welche dreymal behacken.

In Ansehung des Krautabschneidens begeht man fast allgemein den großen Fehler, daß es zu zeitig geschieht, indem viele Landwirthe das Kraut in futterarmen Gegenden zur Fütterung anwenden, sich aber dadurch in Ansehung der Güte und Menge der Kartoffeln ungemein schaden. In der Regel darf vermöge

möge der natürlichen Beschaffenheit dieses Gewächses das Kraut nicht eher bis kurz vor dem Ausnehmen aus der Erde abgeschnitten werden, weil sonst die Kartoffeln eben so als wie der Spargel unaufhörlich bis in den October frische Sprößlinge treibet, wodurch das Wachsthum der Knollen verhindert wird. Wenn daher ein Landwirth kein anderes Futterkraut ansäen will, kann oder darf, so ist diesem nichts anders anzurathen, als daß er zum frühzeitigen Abschneiden einen Theil seines Kartoffelfeldes mit Frühkartoffeln, z. B. Zuckerkartoffeln, glatten gelben, rothen ꝛc. bepflanzet und von diesen mit Ende des Maymonaths anfange das Kraut abzuschneiden.

Neunter Abschnitt.

Von der Aerndte und Aufbewahrung der Kartoffeln.

Von den verschiedenen Sorten der frühzeitigen Kartoffeln können von den im Februar gelegten die ersten schon im Junius und zu Anfange des Julius ausgenommen, verkauft und verspeißt werden; allein die zur Saat bestimmten Frühkartoffeln bleiben bis in den September stehen. Hingegen die im März und April gelegten darf man nicht vor der Mitte des Octobers und die im May gelegten erst im November ausnehmen, wenn die Arten ihre Güte behalten sollen. Ueberhaupt aber hängt das frühere

oder spätere Reifwerden der Kartoffeln, wornach das Ausnehmen derselben sich richtet, sehr von der warmen und kalten, feuchten und trockenen Witterung ab: denn wenn der Sommer kalt und naß gewesen ist, wird die Aerndte um vierzehn Tage später erfolgen, als bey warmen und feuchten oder trockenen Sommern. Dem sey jedoch wie ihm wolle, die Hauptregel wegen des Ausnehmens ist: die Kartoffeln bleiben so lange im Boden ruhig stehen, als der Stängel und die Blätter ihre grüne Farbe behalten, weil dieß das gewisseste Kennzeichen von ihrem fortdauernden Wachsthume abgiebt, und bis der erste leichte Nachtfrost eintritt; alsdenn fange man die Kartoffelärndte an und man wird gute nicht ausgeartete Kartoffeln erhalten.

Das Ausnehmen der Kartoffeln geschieht entweder mit dem Pfluge oder mit dem Spaden oder mit der Grepe und Mistgabel. Den Pflug braucht man in Ireland bey den nach der Drillmethode vorzüglich gepflanzten und läßt zwey Pflüge nach einander folgen; sonst aber den Spaden. Hingegen in England und Schottland z. B. in Herfordshire, Northumberland, North Riding, Suffolk, Yorkshire ꝛc. bedient man sich entweder eines Pfluges mit doppeltem Streichbrete oder eines Pfluges ohne Streichbrete mit einem vierspitzigen Schaare, wovon ich jedem Landwirthe richtige nach verjüngtem Maasstabe gemachte Modelle, das Stück für zwey Reichsthaler ablassen kann. Allein in Essex, Lancashire, auf der

Insel

Inſel Man ꝛc. braucht man entweder den gewöhnlichen Spaden oder die dreyzackige Miſtgabel. Dieſe letztere oder die ſogenannte Grepe iſt ſowohl dem gewöhnlichen Pfluge als auch dem Spaden vorzuziehen, und wird nur von dem Pfluge mit vierſpitzigem Schaare übertroffen. Denn durch den gewöhnlichen Pflug und Spaden werden beym erſten Pflügen zu viele Kartoffeln beſchädigt und durchſchnitten, weil man nicht ſogleich ganz unter den Stock greiffen kann; allein dieſem Schaden weicht man mit der Miſtgabel und dem vierſpitzigen Schaarpfluge aus.

Das Ausnehmen der Kartoffeln, es geſchehe nun mit einem Werzeuge mit welchem es wolle, muß allemahl bey guter trockener Witterung, keinesweges aber im Regenwetter oder gleich nach dem Regen vorgenommen werden.

So wie dieſelben ausgegraben ſind, läßt man die Beſchädigten ausleſen und auf beſondere Haufen legen, die unbeſchädigten aber ſo ganz friſch, ohne daß ſie, wie einige engliſche (auch teutſche) Landwirthe zu thun pflegen, lange an der Luft austrocknen, in Tonnen oder auf den Boden eines trocknen Kellers, wo ſie für dem Froſte ſicher ſind, ſchütten, oder in die Erde eingraben, damit ſie ihre Erdfeuchtigkeit an ſich behalten. Dieß iſt eine zur Wintererhaltung aller Wurzelgewächſe höchſt nöthige Sache, indem die allgemeine Erfahrung gelehrt hat,

daß sie leichter in Fäulniß übergehen, wenn man sie erst abtrocknen läßt. *)

Sollte der Keller die Kartoffeln gegen den Frost nicht schützen können, so müssen sie in demselben mit etwas langen Stroh überdecket und dann mit trockenem Sande beschüttet werden. Denn mit den Kartoffeln hat es in Ansehung des Frostes eine ganz andere Beschaffenheit, als mit den übrigen Wurzelgewächsen. Wenn diese von selbst wiederum aufthauen oder der Frost vor dem Gebrauche durch kaltes Wasser ausgezogen wird, so bleiben sie größtentheils gut und für Menschen und Vieh geniesbar; wenn hingegen die Kartoffeln einmahl gefrohren sind, so bleiben sie gleich dem Obste ganz verdorben und unbrauchbar, so daß man sie schnell hintereinander höchstens gekocht mit den Schweinen verfüttern kann.

Bey unsichern Kellern ist das Beste die Kartoffeln in einer zwey bis drey Ellen tiefen Grube aufzubewahren, welche man unten und auf allen Seiten mit dünnen Bretern ausschaalet, mit langem Stroh ausseßet, die Kartoffeln hineinschüttet und dann mit Erde zwei Fuß hoch bedecket. Hierbey muß man jedoch noch bemerken, daß dergleichen Gruben nicht zu groß angelegt wer-

*) Auch einer unserer besten teutschen Küchengärtner, Hr. Rammelt sagt S. 244. ich habe gefunden, daß die Veränderung, wenn die Gewächse aus der frischen Erde kommen, in die warme Luft gelegt, und hernach wieder in die frische Erde gethan werden, sie in eine gährende Bewegung der Säfte seßet, woraus eine Fäulniß ent-

D. Ueb.

Digitized by Google

werden, damit eine jede, sobald man sie in den Wintermonathen öfnet, in kurzer Zeit ausgeleeret wird.

An feuchten und niedrig liegenden Orten hingegen, wo der Boden der Keller gemeiniglich naß ist, und wo man die Kartoffeln auch nicht in die Erde vergraben kann, da ist das sicherste Mittel eine schlechte Kammer zu nehmen, in derselben einen halben Fuß hoch trockenen Sand aufzuschütten, diesen mit Stroh zu belegen, darauf die Kartoffeln zu bringen, diese wieder mit Stroh und mit einen halben Fuß Sand zu bedecken, so wird man sie gewiß auch gegen den stärksten Frost aufbewahren.

Letzter Abschnitt.

Von der Benutzung der Kartoffeln.

Die Kartoffeln dienen sowohl Menschen als Vieh zur Nahrung und können noch überdieß auf mannichfaltige Art veredelt werden; und in allen drey Königreichen werden sie vom gemeinen Manne theils gekocht theils in Brodt verwandelt gegessen. So verbraucht z. B. in Ireland eine Familie von Mann, Frau und vier Kindern wöchentlich vier Büshels; und wenn sie Haafermehl oder daraus gebackenes Brodt genießen, so brauchen sie davon nur 40 Pfund oder zwey Büshels Haafer. Ueberhaupt genommen aber rechnet man in Großbritannien

auf

auf eine aus fünf Personen bestehende Familie jährlich nicht mehr als zwey hundert und vierzig Büshels. Da man nun in der Regel auf einen Acker dreyhundert Büshels erbauet, so hat eine dergleichen Familie zur Erbauung ihres Kartoffelbedürfnisses mehr nicht als einhundert acht und zwanzig Perches oder Ruthen Land nöthig.

Auser den mancherley Arten die Kartoffeln als Speise zuzubereiten, welche man in der Hausmutter und jedem andern Kochbuche beschrieben findet, dienen sie um Käse und Butter daraus zu machen, Brandtwein daraus zu brennen, Stärke und Haarpuder zu machen, sie anstatt der Seife beym Waschen zu brauchen, mit Wachs vermischt Lichter aus denselben zu ziehen und die aus den Kartoffeln erhaltene Säure zum Verzinnen der Eisenbleche zu brauchen.

Die vertrockneten Blätter der Kartoffeln braucht man in Schweden anstatt des Rauchtabacks und sie sollen in Ansehung des Geruchs und des Geschmacks den gewöhnlichen Taback bey weiten übertreffen.

Endlich geben auch nach des Hrn. Dambourney Versuchen die frischen Stängel mit Blättern und Blumen eine schöne citronengelbe Brühe, wovon die mit Zinn vorbereitete Wolle eine dergleichen durchsichtige und dauerhafte Farbe erhält.

Digitized by Google

In Ansehung der Viehfütterung haben die hiesigen Landwirthe mancherley Versuche angestellt. So fütterte z. B. Hr. Blaylock in Cumberland in drey Monaten eine Kuh mit 120 Büshels Kartoffeln und mit sechszehn Stein Haafermehl und gewann dabey 3 Pfund, 12 Schilling. Hr. Lamb in Cumberland hingegen zieht in Ansehung der Rindviehfütterung einen Acker Turnips einem Acker Kartoffeln vor.

Ein Ochse von 140 Stein, jeden zu 8 Pfund am Gewicht, fraß täglich 1 ½ Büshel Kartoffel; und Hr. Bywell zu Yorkshire fütterte Ochsen zu 70 oder 80 Stein, jeden 14 Pfund am Gewicht, täglich mit etwas Heu und ein Büshel Kartoffeln.

Bey der Schweinefütterung und bey den Schaafen hat man die Kartoffeln nicht nur allgemein wohlfeiler, sondern auch nahrhafter als alles übrige Futter gefunden; und bey fünf Pferden, welche mit Haafer und Heu 64 Pfund 10 Schill. in 26 Wochen zu füttern kosteten, betrug der Aufwand bey der Kartoffelfütterung nur 51 Pfund 13 Schilling, so daß letztere 12 Pfund 17 Schilling wohlfeiler als erstere war.

In Ansehung des Federviehes hat man nur aus Roxburgshire einige Versuche erfahren, wo man mit guten Erfolge mit einigem Mehl vermischt die Federviehfütterung bestreitet.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google